

<b>テトラニプロール粒剤</b> <b>ヨーバル箱粒剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> バイエル  <b>原体メーカー：</b> バイエル
<b>成分：</b> テトラニプロール〔アントラニルジアミド系〕…1.5%	<b>性状：</b> 類白色細粒 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消除法：</b> ——

### 【品目特性】 .....

- イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、ニカメイチュウ、コブノメイガ、フタオビコヤガ等、水稻の主要害虫に高い効果を示す。
- 覆土、床土混和や、は種から移植当日までの幅広い時期で処理が可能。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】 .....

- 本剤を床土又は覆土に混和処理する場合、処理後速やかに使用する。また本剤を処理した床土又は覆土を放置しない。

### 【薬効・薬害等の注意】 .....

- 軟弱徒長苗、ムレ苗、移植適期を過ぎた苗などには薬害を生じるおそれがあるので注意する。
- 本田の整地が不均整な場合は、薬害を生じやすいので、代かきは丁寧に行い、移植後田面が露出しないように注意する。

### 【安全対策上の注意】 .....

- 甲殻類に影響を及ぼすので、使用時並びに使用後も注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。



### 【適用と使用法】 .....

作物名	適有害虫名	1箱*当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	テトラニプロールを 含む農業の総使用回数
稲 (箱育苗)	イネツトムシ イネドロオイムシ イネヒメハモグリバエ イネミズゾウムシ コブノメイガ ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ フタオビコヤガ	50g	は種前	1回	育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。	1回
			は種時 (覆土前) ～移植当日		育苗箱の上から均一に散布する。	

\* 育苗箱は30×60×3cm、使用土壌約5ℓ