

# バスアミド微粒剤

成分：ダゾメット〔PRTR・1種〕……96.5%

毒性：劇物

## 【適用と使用法】

作物名	適用病害虫・雑草名	10 a 当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ダゾメットを 含む農薬の 総使用回数
キャベツ	苗立枯病（リゾクトニア菌） 株腐病 萎黄病 バーティシリウム萎凋病 根こぶ病 ネコブセンチュウ 一年生雑草	20～ 30 kg	は種又は定植 21 日前まで	1 回	本剤の所定量を均一 に散布して土壌と混 和する。	1 回
非結球メキャベツ	萎黄病 一年生雑草		定植21 日前まで			
はくさい	根こぶ病 尻腐病 根くびれ病 黄化病 ネコブセンチュウ 一年生雑草		は種又は定植 21 日前まで			
だいこん	ネグサレセンチュウ	10～ 20 kg	は種21 日前まで			
かぶ	バーティシリウム黒点病 根こぶ病	20～ 30 kg	は種又は定植 21 日前まで			
	萎黄病 一年生雑草		は種10 日前まで			
こまつな	萎黄病 根こぶ病		は種21 日前まで			
しろな	一年生雑草					
ブロッコリー カリフラワー	テンサイシストセンチュウ	30 kg	は種又は定植 21 日前まで			
なばな類 チンゲンサイ	根こぶ病 一年生雑草	20～ 30 kg				
		20 kg				
ひろしまな			は種又は定植 14 日前まで			
みずな	立枯病（ピシウム菌） 根こぶ病 一年生雑草	30 kg	は種12 日前まで			
非結球あぶらな科 葉類 （こまつな、しろな、 チンゲンサイ、 ひろしまな、 みずな、なばな類 を除く）	根こぶ病	20～ 30 kg	は種14 日前まで			
	一年生雑草					
	はつかだいこん	一年生雑草				

作物名	適用病害虫・雑草名	10 a 当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ダゾメットを 含む農薬の 総使用回数
きゅうり	苗立枯病（ビシウム菌） 苗立枯病（リゾクトニア菌）	200～400 g／m <sup>3</sup>	は種又は定植 21 日前まで	1 回	土壌に本剤の所定量 を加え十分混和する。	1 回
	つる割病 半身萎凋病 白絹病 一年生雑草	20～ 30 kg			本剤の所定量を均一 に散布して土壌と混 和する。	
かぼちゃ	苗立枯病（リゾクトニア菌） フザリウム立枯病 一年生雑草					
メロン	黒点根腐病 つる割病 半身萎凋病 黒変根腐症 白絹病 一年生雑草	30 kg			土壌に本剤の所定量 を加え十分混和する。	
	紅色根腐病					
	苗立枯病（リゾクトニア菌）	200～400 g／m <sup>3</sup>			土壌に本剤の所定量 を加え十分混和する。	
すいか	つる割病 白絹病 一年生雑草	20～ 30 kg				
にがうり	つる割病 ネコブセンチュウ 一年生雑草				土壌に本剤の所定量 を加え十分混和する。	
トマト ミニトマト	苗立枯病（リゾクトニア菌）	200～300 g／m <sup>3</sup>			本剤の所定量を均一 に散布して土壌と混 和する。	
	萎凋病 褐色根腐病 白絹病 根腐萎凋病 半身萎凋病 ネコブセンチュウ 一年生雑草	20～ 30 kg				
	紅色根腐病					
		30～ 60 kg				
	青枯病	30 kg				
なす	苗立枯病（リゾクトニア菌） 半身萎凋病 白絹病 ネコブセンチュウ 一年生雑草	20～ 30 kg				
	ピーマン					
ばれいしょ	そうか病 粉状そうか病 黒あざ病 萎凋病 一年生雑草	20～ 30 kg	植付21 日前まで			

作物名	適用病害虫・雑草名	10 a 当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ダゾメットを 含む農薬の 総使用回数
とうがらし類	苗立枯病(リゾクトニア菌) 萎凋病 疫病 青枯病 一年生雑草	30 kg	定植21 日前まで	1 回	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。	1 回
ね       ぎ	黒腐菌核病	30～ 60 kg	は種又は定植 14 日前まで			
	紅色根腐病 ネギハモグリバエ	30 kg				
	苗立枯病(リゾクトニア菌) 白絹病 小菌核腐敗病 萎凋病 根腐萎凋病 ネコブセンチュウ 一年生雑草	20～ 30 kg				
	苗立枯病(リゾクトニア菌) 一年生雑草					
わ   け   ぎ	苗立枯病(リゾクトニア菌) 一年生雑草					
たまねぎ	黒腐菌核病	30～ 60 kg	は種又は定植 21 日前まで			
	紅色根腐病	30 kg				
	乾腐病 白絹病 ネコブセンチュウ 一年生雑草	20～ 30 kg				
	苗立枯病	20～ 40 kg				
	黒穂病 一年生雑草	20～ 30 kg	秋期 (翌春は種)			
	べと病	20 kg				
葉たまねぎ (苗床)	一年生雑草	10～ 20 kg	は種14 日前まで		本剤の所定量を均一に散布して浅く混和する。	
に   ん   に   く	紅色根腐病 白絹病 イモグサレセンチュウ 一年生雑草	30 kg	植付28 日前まで		本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。	
ら   っ   き   よ   う	根腐病 乾腐病 ネコブセンチュウ 一年生雑草		植付21 日前まで			
に       ら	乾腐病 紅色根腐病 白絹病		は種又は定植 21 日前まで			
	一年生雑草					

作物名	適用病害虫・雑草名	10 a 当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ダゾメットを 含む農薬の 総使用回数
に ん じ ん	萎凋病 根腐病 しみ腐病 乾腐病 白絹病 ネコブセンチュウ 一年生雑草	20～ 30 kg	は種又は定植 21 日前まで	1 回	本剤の所定量を均一 に散布して土壌と混 和する。	1 回
パ セ リ	苗立枯病(リゾクトニア菌) 疫病 萎凋病 一年生雑草	30 kg				
セ ル リ ー	萎黄病 一年生雑草					
あ し た ば	苗立枯病(リゾクトニア菌) 一年生雑草		は種 10 日前まで			
し ゅ ん ぎ く	萎凋病 一年生雑草	20 kg	は種 21 日前まで			
ご ぼ う 葉 ご ぼ う	萎凋病 黒あざ病 一年生雑草	20～ 30 kg	は種 28 日前まで			
も り あ ざ み	黒あざ病 半身萎凋病 一年生雑草	30 kg	は種 21 日前まで			
レ タ ス	すそ枯病 白絹病 一年生雑草	20～ 30 kg	は種又は定植 14 日前まで			
	ネグサレセンチュウ	30 kg				
非結球レタス	すそ枯病 根腐病 白絹病 一年生雑草	20～ 30 kg	は種又は定植 21 日前まで			
食 用 ぎ く	萎凋病 半身萎凋病 白絹病 センチュウ類 (ハガレセンチュウを除く) 一年生雑草					
	青枯病					
ふ き	半身萎凋病 白絹病 一年生雑草	30 kg				
み つ ば	立枯病 一年生雑草	20 kg	は種 21 日前まで			
豆 類 (未成熟、但し、 えだまめ、 実えんどう、 さやえんどう、 さやいんげん、 未成熟そらまめ を除く)	苗立枯病(リゾクトニア菌) 茎腐病 一年生雑草	30 kg				

作物名	適用病害虫・雑草名	10 a 当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ダゾメットを 含む農薬の 総使用回数
さやえんどう 実えんどう	苗立枯病(リゾクトニア菌) 茎腐病 一年生雑草	20～ 30 kg	は種又は定植 21 日前まで	1 回	本剤の所定量を均一 に散布して土壌と混 和する。	1 回
えだまめ	ダイズシストセンチュウ 苗立枯病(リゾクトニア菌) 葉腐病	30 kg				
さやいんげん	白絹病 一年生雑草	20～ 30 kg	は種 21 日前まで			
未成熟そらめ	苗立枯病(リゾクトニア菌) 茎腐病 えそモザイク病 一年生雑草	30 kg	は種 21 日前 又は 定植 45 日前まで			
かんしょ	紫紋羽病 つる割病 白絹病 ネコブセンチュウ 一年生雑草	20～ 30 kg	植付 21 日前まで			
こんにゃく	白絹病 乾腐病					
	根腐病 一年生雑草	20～ 60 kg				
さといも さといも(葉柄)	乾腐病 ネグサレセンチュウ 一年生雑草	20～ 30 kg				
しょうが	根茎腐敗病	30～ 60 kg	定植 21 日前まで			
	一年生雑草	20～ 30 kg				
葉しょうが	根茎腐敗病	30 kg				
	一年生雑草	20～ 30 kg				
みょうが(花穂) みょうが(茎葉)	立枯症 一年生雑草	30 kg	定植 42 日前まで			
いちご	萎黄病 萎凋病 炭疽病 芽枯病 一年生雑草	20～ 30kg	仮植又は定植 21 日前まで			
	青枯病 疫病	30kg				
ほうれんそう	立枯病 萎凋病 株腐病 根腐病 ホウレンソウケナガコナダニ 一 年生雑草	20～ 30kg	は種 10 日前まで			
てんさい	叢根病 苗立枯病	200～ 400g/m <sup>3</sup>	秋期 (翌春は種)			
やまのいも	根腐病 褐色腐敗病 一年生雑草	20～ 30kg	植付 21 日前まで			

作物名	適用病害虫・雑草名	10 a 当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ダゾメットを 含む農薬の 総使用回数
つるむらさき	ネコブセンチュウ	20～ 30kg	定植21日前まで	1 回	本剤の所定量を均一 に散布して土壌と混 和する。	1 回
モロヘイヤ	一年生雑草		定植30日前まで			
しそ	青枯病 一年生雑草	30kg	は種又は定植 14日前まで			
チャービル	一年生雑草	20kg	は種42日前まで			
なし	白紋羽病	100g/m <sup>2</sup>	夏期～秋期		被害株跡地に本剤の 所定量を均一に散布 して土壌と十分混和 する。	
ぶどう	紫紋羽病	50～				
りんご	白紋羽病	100g/m <sup>2</sup>				
花き類・ 観葉植物	苗立枯病(リゾクトニア菌) 株腐病 球根腐敗病 首腐病 半身萎凋病 萎凋病 萎黄病 白絹病 立枯病 根頭がんしゅ病 ネコブセンチュウ	20～ 30kg	は種又は植付前		本剤の所定量を均一 に散布して土壌と混 和する。	
	青枯病	30kg				
	一年生雑草	20～ 60kg				
	カーネーション	萎凋細菌病		20～ 30kg		
	きく	センチュウ類 (ハガレセンチュウを除く)				
ストック	苗腐病	30～ 40kg	植付前			
	萎凋病					
ぼたん しゃくやく	根黒斑病					
スターチス	萎凋細菌病	20～ 30kg	は種又は植付前			
グロリオサ	紅色根腐病					
スイトピー	腰折病					
さくらそう	軟腐病					
トルコギキョウ	根腐病					
パンジー						
アイランドビー	萎縮病					
せんりょう	立枯病 一年生雑草					
つつじ類	センチュウ類 一年生雑草					
樹木類 (苗木)	一年生雑草				植付前	

作物名	適用病害虫・雑草名	10 a 当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ダゾメットを 含む農業の 総使用回数
た ば こ	角斑病 野火病 センチュウ類	10～ 20kg	秋期 (翌春植付)	1 回	本剤の所定量を均一 に散布して土壌と混 和する。	1 回
	立枯病 黒根病 疫病 一年生雑草	20～ 30kg			本剤の所定量を畦面 に散布して土壌と十 分混和する。	
	疫病 センチュウ類	5～ 10kg	春期 (植付前)			
芝	一年生雑草	目土用 土1m <sup>3</sup> 当 り100～ 200g	雑草発生前	1 回	土壌に本剤の所定量 を加え十分混和する。	1 回
		30kg	は種又は 定植 21 日前まで		本剤の所定量を均一 に散布して土壌と混 和する。	
桑	紫紋羽病 白紋羽病	1株当り (4m <sup>2</sup> ) 400～ 600g	夏期～秋期		被害株跡地に本剤の 所定量を均一に散布 して土壌と十分混和 する。	

作物名	使用目的	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ダゾメットを含む 農業の総使用回数
樹 木 類	定植ほ場の南根 腐病菌の密度低 減	100g/m <sup>2</sup>	定植前	1 回	被害株跡地に本剤の所 定量を均一に散布して 土壌と十分混和する。	1 回

〔取扱メーカー〕 カネショウ