

クロラントラニブロール・トリフルメゾピリム・イソチアニル・フラメトビル粒剤 箱維新粒剤	取扱メーカー： 協友アグリ 原体メーカー： FMC, 全農・デュポン, 住友化学・バイエル, 住友化学
成分： クロラントラニブロール〔アントラニリックジアミド系〕…0.75% トリフルメゾピリム〔メソイオン系〕……………0.75% イソチアニル〔チアジアゾールカルボキサミド系〕…2.0% フラメトビル〔酸アミド系〕……………4.0%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： ——

【適用と使用方法】

作物名	適用病害虫名	1箱*当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 紋枯病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) もみ枯細菌病 内穎褐変病 白葉枯病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ イネツトムシ フタオビコヤガ コブノメイガ	50g	移植7日前 ～移植当日	育苗箱の 上から均 一に散布 する。	本剤 クロラントラニブロール 1回 トリフルメゾピリム 1回 イソチアニル 3回以内 (移植時までの処理は1回以内, 本田では2回以内) フラメトビル 2回以内 (移植時までの処理は1回以内)

* 育苗箱は30×60×3cm, 使用土壌約5ℓ