

|   |   |
|---|---|
| <b>イミダクロプリド・スピノサド・チフルザミド・トリシクラゾール粒剤</b><br><b>フルサポート箱粒剤</b>   | <b>取扱メーカー：</b><br>クミカ，サンケイ*，ダウ<br><br><b>原体メーカー：</b><br>バイエル，ダウ，日産，ダウ |
| <b>成分：</b> イミダクロプリド〔クロロニコチニル系〕……………2.0%<br>スピノサド〔スピノシン系〕……………0.75%<br>チフルザミド〔酸アミド系〕……………3.0%<br>トリシクラゾール〔メラニン生合成阻害剤〕……………4.0% | <b>性状：</b> 類白色細粒<br><b>毒性：</b> 普通物<br><b>消防法：</b> ——                  |

### 【適用と使用法】 .....

| 作物名        | 適用病害虫名  | 1箱*当り<br>使用量 | 使用時期         | 使用方法                      | 総使用回数  |
|------------|---|--------------|--------------|---------------------------|--|
| 稲<br>(箱育苗) | いもち病<br>紋枯病<br>ウンカ類<br>ツマグロヨコバイ<br>ニカメイチュウ<br>コブノメイガ<br>イネツトムシ<br>フタオビコヤガ<br>イネドロオイムシ<br>イネミズゾウムシ | 50 g         | 移植2日前<br>～当日 | 育苗箱の苗の<br>上から均一に<br>散布する。 | 本剤 1回<br>イミダクロプリド 3回以内<br>(移植時までの処理は1回<br>以内，本田での散布は2<br>回以内)<br>スピノサド 1回<br>チフルザミド 3回以内<br>(移植時までの処理は1回<br>以内，本田では2回以内)<br>トリシクラゾール 4回以内<br>(育苗箱への処理は1回以<br>内，本田では3回以内) |

\*育苗箱は30×60×3cm，使用土壌約5ℓ