

<b>フルベンジアミド水和剤</b> <b>フェニックス顆粒水和剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> 日農、日本曹達  <b>原体メーカー：</b> 日農
<b>成分：</b> フルベンジアミド……………20.0%	<b>性状：</b> 褐色水和性細粒 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【品目特性】……………

- 全く新しいタイプの殺虫剤で、ユニークな作用機作を持つ薬剤である。
- ユニークな作用機作により、各種薬剤に抵抗性の発達した害虫にも有効である。
- 幅広い種類のチョウ目幼虫に優れた効果を示す。
- 効果持続性に優れるため、害虫に対して散布後長期間、安定した効果を示す。
- 速やかに害虫の摂食行動を阻害し、高い食害抑制効果を示す。
- 天敵・有用昆虫に対する影響の少ない薬剤である（蚕を除く）。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節する。
- 本剤は植物体への浸透移行性による効果は弱いので、かけ残しのないように葉の表裏に十分散布する。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- ぶどうの幼果期から果粒肥大期に使用する場合、果粉の溶脱が生じるおそれがあるので注意する。
- 西洋なしの品種ルレクチュは落果後から袋かけ前までの散布については、リング状の葉斑が生じるおそれがあるので使用をさける。
- 共通注意事項8. 適用作物群に関する注意事項を参照。

### 【安全対策上の注意】……………

- 蚕に対しては長期間毒性があるので、近くに桑園のある場合には絶対に桑葉にかからないようにする。
- 甲殻類に影響を及ぼすおそれがあるので、使用時は注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。
- 無人航空機散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。



### 【適用と使用法】……………

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	フルベンジアミドを 含む農薬の総使用回数
もも ネクタリン	ハマキムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類 ケムシ類	4000 倍	200～ 700 ℓ	前日まで	2 回以内	散布	3 回以内 (樹幹散布は 1 回以内、 散布は 2 回以内)
おうとう	ハマキムシ類						
小粒核果類 (うめ、すもも を除く)	ケムシ類						2 回以内

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	フルベンジアミドを 含む農薬の総使用回数					
う め	ケムシ類	4000 倍	200～ 700 ℓ	前日まで	2 回以内	散布	3 回以内 (樹幹散布は 1 回以内, 散布は 2 回以内)					
す も も	シンクイムシ類 ケムシ類						4000 倍	14 日前まで	2 回以内	3 回以内 (樹幹散布は 1 回以内, 散布は 2 回以内)		
な し	ハマキムシ類 シンクイムシ類 ケムシ類										4000 倍	7 日前まで
り ん ご	ハマキムシ類	4000～ 6000 倍										
	ギンモンハモグリガ キンモンホソガ ヨモギエダシャク シンクイムシ類 ケムシ類	4000 倍		7 日前まで			3 回以内					
	ぶ ど う							ハスモンヨトウ ハマキムシ類 ケムシ類	3 回以内			
	か き							カキノヘタムシガ イラガ類		2 回以内		
かん き つ	ミカンハモグリガ ハマキムシ類 ケムシ類 アゲハ類							2 回以内				
キウイフルーツ	ハマキムシ類	2 回以内										
とうもろこし ヤングコーン	アワノメイガ オオタバコガ		2 回以内									
そ ば	ハスモンヨトウ			2 回以内								
キ ャ ベ ツ	ヨトウムシ オオタバコガ アオムシ コナガ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ ウワバ類				2000～ 4000 倍		前日まで	3 回以内	4 回以内 (灌注は 1 回以内, 散布は 3 回以内)			
	メ キャベツ	アオムシ コナガ ウワバ類								2000 倍	3 回以内	
は く さ い	オオタバコガ アオムシ コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ	2000～ 4000 倍	前日まで									2 回以内
	カリフラワー			コナガ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ								
ブロッコリー	ハイマダラノメイガ ヨトウムシ コナガ ハスモンヨトウ			2 回以内								

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	フルベンジアミドを 含む農業の総使用回数	
なばな類 <small>糸結球あぶらな科葉菜類 (チンゲンサイを除く)</small>	コナガ	2000～ 4000 倍	100～ 300 ℓ	前日まで	2回以内	散布	2回以内	
チンゲンサイ	コナガ ハスモンヨトウ						3回以内 (灌注は1回 以内、散布は 2回以内)	
レタス	ウワバ類 ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ						2回以内	
非結球レタス							2回以内	
ねぎ	シロイチモジヨトウ ネギコガ			7日前まで	3回以内		3回以内	
かぶ	ハイマダラノメイガ コナガ			前日まで	2回以内		2回以内	
だいこん	ハイマダラノメイガ コナガ			7日前まで	1回		1回	
はつかだいこん	コナガ	2回以内			2回以内			
わさびだいこん	コナガ	2000倍		前日まで	2回以内		3回以内	
きゅうり にがうり	ハスモンヨトウ ウリノメイガ	2000～ 4000倍			3回以内		3回以内	
すいか	ハスモンヨトウ ウリノメイガ オオタバコガ				2回以内		2回以内	
メロン	ウリノメイガ オオタバコガ							
なす	ハスモンヨトウ オオタバコガ アズキノメイガ				4000倍		3回以内	3回以内
トマト ミニトマト いちご	ハスモンヨトウ オオタバコガ	2000～ 4000倍	前日まで		2回以内	2回以内		
ピーマン とうがらし類	オオタバコガ							
にんじん	ヨトウムシ							
ごぼう ばれいしょ かぼちゃ セルリー	ハスモンヨトウ							
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	2000～ 6000倍			100～ 300 ℓ		14日前まで	散布
さといも	ハスモンヨトウ	16～ 32倍						
やまのいも	ナガイモコガ ハスモンヨトウ						2000～ 4000倍	
やまのいも (むかご)	ヨトウムシ	5000～ 6000倍		3回以内				
てんさい	ハスモンヨトウ		2000 倍			2回以内		
はすいも (葉柄)		7日前まで		2回以内				
しそ								

