

<b>トリシクラゾール粉剤</b> <b>ビーム粉剤 DL</b>	<b>取扱メーカー：</b> クミカ，サンケイ*，住友化学  <b>原体メーカー：</b> ダウ
<b>成分：</b> トリシクラゾール.....1.0%	<b>性状：</b> 類白色粉末45 $\mu$ m 以下， 浮遊性指数20 以下  <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> —

### 【品目特性】 .....

●広域に使用すると間接作用(二次感染阻止作用)が大きく働き，防除効果の持続性はより増強される。

●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】 .....

〈葉いもち〉

●発生が予想される時，又は初発生を見た時直ちに散布する。

〈穂いもち〉

●穂ばらみ期の後期に散布する。多発生が予想される場合には，出穂後の散布を追加する。

### 【薬効・薬害等の注意】 .....

●適用外作物（なし，野菜類）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

### 【安全対策上の注意】 .....



### 【適用と使用法】 .....

作物名	適用病害名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	トリシクラゾールを 含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	3 ～ 4 kg	7 日前まで	3 回以内	散布	4 回以内
	穂枯れ (ごま葉枯病菌)	4 kg				(育苗箱への処理は 1 回以内， 本田では 3 回以内)