

取扱メーカー:

協友アグリ, サンケイ*

原体メーカー: 住友化学・日農

'R·1種] ·······3.0% 性状:類白色粉末45μm以下,

浮遊性指数20以下

毒性:劇物 消防法:——

- ●吸汁性害虫のウンカ, ヨコバイに対し, 食毒及び接触毒として作用する。
- ●ウンカ,ヨコバイ類に対して速効的に作用する。 低温時も殺虫力の低下がない。ウンカ,ヨコバイ 類の天敵であるクモ類に影響が少ない。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一 覧表」を参照。

【使用上のポイント】…………

〈ツマグロヨコバイ〉(感受性に留意する。)

●出穂期以降の防除では幼虫の比率の多い時期に 散布する。

〈ウンカ類〉

●トビイロウンカ, セジロウンカの防除の適期は 7月末~8月初め及び8月中下旬で, トビイロウンカの多発の際はその後も, 収穫期近くまで防除が必要。

【安全対策上の注意】 ……………

- ●魚類, 甲殻類に影響を及ぼすので, 使用時並び に使用後も注意。
- ●魚類に低濃度でも影響を及ぼすので注意。
- ●散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。
- ●共通注意事項7. ミツバチに対する注意事項を 参昭。









【適用と使用法】……

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期 (収穫前)	本剤及びBPMCを 含む農薬の総使用回数	使用方法
稲	ツマグロヨコバイ ウンカ類	3 ∼ 4 kg /10a	7日前まで	5 回以内	散布
小 麦	ヤギシロトビムシ	種子重量の3%	は種前	1 🗆	種子粉衣