

メプロニル水和剤 バシタックゾル	取扱メーカー： クミカ 原体メーカー： クミカ
成分： メプロニル〔酸アミド系 PRTR・1種〕……………40.0%	性状： 類白色水和性粘稠液体， 粘度450cp，比重1.06（20℃） 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- 空散用のみでなく地上用の液剤散布も可能。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 紋枯病に対して最も防除効果の高いのは病斑の垂直進展初期である。地域により天候によりこの時期は異なるので地域により年によってこの時期に近いところで散布時期を決定する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 使用に際し，容器をよく振ってから使用する。
- 散布液調製後は速やかに使用する。

- 本田の水稻に対して希釈倍数300倍で散布する場合は，所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用する。
- 適用外作物（ぶどう）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 桑葉にかからないように注意する。
- 空中散布及び無人ヘリコプター散布の際は，共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。
- 魚類に影響を及ぼすので，使用時は注意。

【適用と使用法】……………

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	メプロニルを含む 農薬の総使用回数
稲	紋枯病	6～8倍	800 ml	14日前 まで	3回以内	無人ヘリコプターによる散布	3回以内
		25～30倍	3 ℓ			空中散布	
		300倍	25 ℓ				
		800～1000倍	——			散布	