

ミルベメクチン乳剤 コロマイト乳剤	取扱メーカー： 三井アグロ、ホクサン、琉産 原体メーカー： 三井アグロ
成分： ミルベメクチン……………1.0% その他 PRTR 該当成分： 1,3,5-トリメチルベンゼン〔PRTR・1種〕……………2.4% ポリ（オキシエチレン）=ノニルフェニルエーテル〔PRTR・1種〕…1.8%	性状： 淡黄色澄明可乳化油状液体 毒性： 普通物 消防法： 第4類・第2石油類（非水溶性）・危険等級Ⅲ

【品目特性】……………

- 天然物由来の殺ダニ剤で、既存の薬剤との交差抵抗性がない。
- 速効的に作用する。
- ハダニ類の成虫・幼虫、卵いずれのステージに対しても低薬量で高い殺ダニ・殺卵活性を示す。致死濃度以下でも雌成虫の産卵を抑制し、密度回復を遅らせる。
- 環境での分解が早い。
- 温度による影響をほとんど受けず、低温時にも効果を発揮する。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期（密度上昇開始期）に散布ムラのないようにていねいに散布すると効果的である。
- 本剤の連続散布は、ハダニ類の本剤に対する抵抗性を増加させるおそれがあるので、できるだけ年1回の散布とし、他の殺ダニ剤との輪番で使用する。
- ハモグリバエ防除に使用する場合、老齢幼虫に対する効果が劣る場合があるので発生初期に時期を失せず、散布する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 高温、乾燥時の散布は薬害のおそれがあるのでさける。
- 樹勢の弱っている果樹には散布しない。
- 展着剤によっては薬害を生じるおそれがあるので、展着剤混用の際は事前にその適否を確認してから使用する。

- 適用作物（りんご、なし、洋なし（ル・レクチェ）、なす、水なす、賀茂なす（大芹川種）、施設栽培いちじく）の薬害は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用作物外（いちご（親株床以外））への薬害は「薬害注意事項解説」参照。
- なすの水なす及び加茂なす（大芹川種）には薬害のおそれがあるので、使用しない。
- せり（水耕栽培）に使用する場合、本剤を使用した施設からの廃液を灌漑水路、排水路、河川等には絶対に流さず、適切に処理する。

【安全対策上の注意】……………

- 共通注意事項7. ミツバチに対する注意事項を参照。
- 共通注意事項8. 適用作物群に関する注意事項を参照。
- 自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないように注意する。
- 誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせる。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受ける。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し眼科医の手当を受ける。
- 原液は皮膚に対して刺激性があるので、散布液調製時には手袋を着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 危険物第四類第二石油類に属するので火気には十分注意する。
- 火気をさけ、保管する。



【適用と使用方法】

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	ミルベメクテンを含 む農薬の総使用回数	
りんご	—	ハダニ類 キンモンホソガ リンゴサビダニ ユキヤナギアブラムシ	1000 倍	200～ 700 ℓ	前日まで	1 回	散布	1 回	
もも ネクタリン		ハダニ類 モモサビダニ			7 日前まで				
小粒核果類 いちじく		ハダニ類			前日まで				
なし		ニセナシサビダニ							
おうとう パパイヤ		ハダニ類	1000～ 1500 倍	7 日前まで	2 回以内	2 回以内			
あずき			1000 倍						
だいず いんげんまめ			1000～ 2000 倍	100～ 150 ℓ				14 日 前 まで	
豆類(未成熟)			1500 倍	7 日前まで					
いちご(親株床)			1000～ 1500 倍	前日まで					
なし			1000～ 1500 倍	仮植前まで					
								ハダニ類	1500 倍
ハモグリバエ類 コナジラミ類 チャノホコリダニ			1000～ 1500 倍	100～ 300 ℓ					
ハモグリバエ類 トマトサビダニ コナジラミ類								コナジラミ類	2000 倍
ピーマン			チャノホコリダニ	1000～ 1500 倍				3 日前まで	2 回以内
ししとう 甘長とうがらし		ハダニ類	1000 倍						
		コナジラミ類	2000 倍						
きゅうり		ハダニ類	1000～ 1500 倍	7 日前まで	2 回以内	2 回以内			
きゅうり(花) きゅうり(葉)		コナジラミ類	1500 倍						
		食用へちま	ハモグリバエ類	1000 倍	前日まで	1 回		1 回	
すいか		ハダニ類	1000 倍						
メロン		コナジラミ類 ハモグリバエ類		2000 倍	前日まで	2 回以内		2 回以内	
しそ科葉菜類 (えごま(葉)、 しそを除く)		ハダニ類	1 回						
えごま(葉)						2 回以内		2 回以内	

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	ミルベメクチンを含む 農薬の総使用回数					
しそ	—	サビダニ類 チャノホコリダニ	2000 倍	100～ 300 ℓ	前日まで	2回以内	散布	2回以内					
しそ（花穂）		ハダニ類		100～ 300 ℓ		1 回		2回以内					
モロヘイヤ			2000 倍						2回以内				
エンサイ					2000 倍								
ふだんそう						2000 倍							
アスパラガス			2000 倍										
さんしょう(葉)					シクラメンホコリダニ			1000 倍	7日前まで	1 回			
なんてん(葉)		3日前まで		2回以内									
せんぶり			3日前まで 但し、 伏せ込み栽培は伏せ込み前まで			1 回							
せり科葉菜類 (みつば、 コリアンダー(葉)、 セルリー、 せり(水耕栽培) を除く)					2回以内								
みつば		1 回											
コリアンダー(葉)	3日前まで		1 回										
セルリー				2回以内									
せり(水耕栽培)		1 回											
あしたば	ハダニ類		1000 倍		100～ 500 ℓ	7日前まで	2回以内	散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する。	2回以内				
かんしょ ざといも ざといも(葉柄) はすいも(葉柄)				100～ 400 ℓ						前日まで	2回以内		
やまのいも やまのいも(むかご)		2回以内											
みょうが (花穂)												2回以内	
みょうが (茎葉)													2回以内
みょうが (花穂)													
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									
みょうが (茎葉)					2回以内								
みょうが (花穂)						2回以内							
みょうが (茎葉)	2回以内												
みょうが (花穂)			2回以内										
みょうが (茎葉)		2回以内											
みょうが (花穂)				2回以内									

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	ミルベメクチンを含 む農薬の総使用回数
食用金魚草 食用なでしこ しよくようほおずき 食用ミニバラ	—	ハダニ類	2000 倍	100 ～ 300 ℓ	前日まで	2 回以内	散布	2 回以内
食用プリムラ 食用カーネーション 食用エキザカム 食用せんにちこう 食用トレニア 食用パンジー						1 回		1 回
き く (葉)		ハモグリバエ類 ハダニ類	1500 倍			2 回以内		2 回以内
き く		ハダニ類	1000 ～ 1500 倍	100 ～ 200 ℓ	—	2 回以内		2 回以内
宿根かすみそう								