

フロメトキン水和剤 ファインセーブフロアブル	取扱メーカー： 北興、日本化薬、Meiji 原体メーカー： 日本化薬
成分： フロメトキン……………10.0%	性状： 類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 劇物 消防法： —

【品目特性】……………

- 新規系統、新規作用機作で既存剤に感受性が低下したアザミウマ類に有効な薬剤。
- 天敵・有用昆虫への影響が小さく使いやすい。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 浸達性、浸透移行性がないので、展着剤を加用してかけムラがないよう丁寧に散布する。
- 抵抗性回避のため、他系統薬剤とのローテーション防除を心掛ける。

【薬効・薬害等の注意】……………

- かけムラのないように葉の表裏に十分散布する。

【安全対策上の注意】……………

- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意する。
- 桑葉にかからないよう注意（蚕毒）。
- 施設内で使用する場合、窓等を開放し十分に換気してから施設内に立ち入る。
- 魚類に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意。養殖池周辺での使用はさける。
- 甲殻類に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意。



【適用と使用方法】

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	フロメトキンを含む 農薬の総使用回数
かんきつ	アザミウマ類 ミカンサビダニ	2000～ 4000倍	200～ 700ℓ	7日前 まで	2回以内	散布	2回以内
なす	タバココナジラミ類（シルバーリーフコナジラミを含む）	1000倍	100～ 300ℓ	前日まで	3回以内		3回以内
	アザミウマ類	1000～ 2000倍					
トマト	トマトサビダニ	1000～ 4000倍					
	タバココナジラミ類 （シルバーリーフコナジラミを含む）	1000～ 2000倍					
		1000倍					
ピーマン							
すいか いちご	アザミウマ類	1000～ 2000倍					
はくさい	アオムシ	1000倍		7日前 まで	2回以内		2回以内
	コナガ	1000～ 2000倍		3日前 まで			
キャベツ	アザミウマ類						
	だいこん	コナガ		1000～ 2000倍			
ねぎ	ネギハモグリバエ	2000倍		3日前 まで			
	たまねぎ	アザミウマ類			1000～ 2000倍		
ほうれんそう				2000倍	14日前 まで		2回以内
茶	チャノホソガ	2000～ 4000倍		200～ 400ℓ	摘採14日 前まで		
	チャノキイロアザミウマ	1000～ 4000倍					
きく	アザミウマ類	2000倍	100～ 300ℓ	発生初期			