メタフルミゾン粒剤 **アクセルベイト**

取扱メーカー: サンケイ, 日農

原体メーカー: 日農

成分: メタフルミゾン〔セミカルバゾン系〕 ·············0.20% その他 PRTR 該当成分:

性状:淡褐色粒状 径3mm, 長さ2~10mm

毒性:普通物 消防法:——

2,6-ジ-ターシャリ - ブチル-4-クレゾール〔PRTR・1種〕…1.0%

- ●大型チョウ目害虫に高い効果を示すメタフルミ ゾンを有効成分とするベイト剤である。
- ●粒剤処理で植付後に問題になるネキリムシ類を 簡便に防除できる。
- コオロギ類やハスモンヨトウの防除にも使用することができる。
- ●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一 覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

●ハスモンヨトウの防除に使用する場合は、地表 部に生息する幼虫に対し有効であるので時期を失 しないように使用する。

【薬効・薬害等の注意】 …………

- ●作物体にかからないよう株元の土壌表面に散布 する。
- ●共通注意事項 8. 適用作物群に関する注意事項 を参照。

- ●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはか からないようにする。
- ●作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- ●共通注意事項7.ミツバチに対する注意事項を 参照。

【適用と使用法】……

作物名	適用害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	メタフルミゾンを含 む農薬の総使用回数
キャベツはくさい	コオロギ類 ネキリムシ類 ハスモンヨトウ	3∼6kg 6kg	7日前まで	3回以内	株元散布	3回以内
だいこんブロッコリー	ネキリムシ類 ネキリムシ類 コオロギ類		前日まで	2回以内		2回以内
非結球レタス レ タ ス ね ぎ	ネキリムシ類			3回以内 2回以内		3回以内 2回以内
アスパラガス い ち ご	ハスモンヨトウ ネキリムシ類			3回以内		
にんじん	ハスモンヨトウ コオロギ類					3回以内
ごだ だだ だまが しょうが	ネキリムシ類	3∼6kg				
花 き 類・ 観 葉 植 物			生育期	6回以内		6回以内