ブロフラニリド水和剤 <b>ブロフレア SC</b>	<b>取扱メーカー:</b> 三井アグロ, 北興 <b>原体メーカー:</b> 三井アグロ
成分: ブロフラニリド〔メタジアミド系〕5.0%	性状:黄色水和性粘稠懸濁液体 毒性:普通物 消防法:——

#### 

- ●新規作用機構をもつ有効成分を含む殺虫剤である。
- ●既存剤に抵抗性を獲得した害虫にも優れた効果 を示す。
- ●チョウ目・ハムシの専門剤として同時防除が可能。
- ●数時間で作用を発現し、速やかな殺虫効果を示 す
- ●効果持続性に優れ、葉面上で3週間程度の効果を示す。
- ●耐雨性に優れ、突然の降雨があっても効果の持 続性に変わりはない。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一 覧表」を参照。

## 【使用上のポイント】…………

- ●散布量は対象作物の生育段階,栽培形態及び散布方法に合わせ,調節する。
- ●植物体への浸透移行性がないので、かけ残しの ないように葉の裏表に十分に散布する。

### 【薬効・薬害等の注意】 …………

- ●みずかけな(水掛菜)に使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用する。また、使用後14日間は入水しない。
- ●共通注意事項 8. 適用作物群に関する注意事項を参照。

## 

- ●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはか からないようにする。
- ●共通注意事項7. ミツバチに対する注意事項を 参昭.
- ●甲殻類に影響を及ぼすおそれがあるので,河川, 養殖池等に飛散,流入しないよう注意して使用す ス
- ●散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。



# 

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	
作物名       キャイ く       が プロッフラのぶ。       非結球球ー       非結球球ー	コナガシントカーウー オファハヨオハコヨハキオワイナオストカイナカー カーカー カーカー カーカー カーカー カーカー カーカー カーカー	<b>希釈倍数</b> 2000~ 4000倍		<b>使用時期</b> 収穫前で			む農薬の総使用回数
非結球あぶら な 科 葉 菜 類 レ タ ス 非結球レタス	アオムシ キスジノミハムシ ハスモンヨトウ ヨトウムシ オオタバコガ ウワバ類						
ね ぎ	ネギコガ シロイチモジヨトウ						
えだまめ	ハスモンヨトウ オオタバコガ ハスモンヨトウ						
かんしょ	ナカジロシタバ ハスモンヨトウ						
きく	オオタバコガ			発生初期			