

<p>ペノキスラム・ベンゾビスクロン剤</p> <p><b>テッケン</b></p> <p><b>(1キロ粒剤 / ジャンボ)</b></p>	<p>取扱メーカー： 日農</p> <p>原体メーカー： ダウ、エス・ディー・エス</p>
<p><b>成分：</b>ペノキスラム〔スルホンアミド系〕…0.50%(粒剤), 1.0%(ジャンボ) ベンゾビスクロン〔ビスクロオクタン系〕…2.0%(粒剤), 4.0%(ジャンボ)</p>	<p><b>性状：</b>類白色細粒(粒剤), 類白色細粒 水溶性パック入り1パック50g(ジャンボ)</p> <p><b>毒性：</b>普通物 <b>消防法：</b>——</p>

## 【品目特性】 .....

●ペノキスラムにベンゾビスクロンを混合することにより残効性を強化した水稲用中・後期除草剤である。

●ノビエを始め、ホタルイや一年生雑草等のスルホニルウレア抵抗性雑草、オモダカ、クログワイなどの多年生雑草に対して高い除草効果を示す。

●落水せずに処理することができる。

●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

## 【使用上のポイント】 .....

### 〈共通〉

●共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。

●前処理剤との体系で使用し、雑草の発生状況をよく確認し、時期を失しないように散布する。

●多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布するように注意する。

雑草名	散布適期	
	粒剤	ジャンボ
ホタルイ	4葉期まで	4葉期まで
ヘラオモダカ		—
ミズガヤツリ		3葉期まで
ウリカワ	5葉期まで	4葉期まで
ヒルムシロ	発生期まで	発生盛期まで
オモダカ	発生盛期～矢じり葉抽出期(草丈30cm以下)	発生前～矢じり葉抽出期(草丈30cm)まで
クログワイ	草丈20cm以下まで	発生前～草丈20cmまで
シズイ		—
コウキヤガラ		—
セリ	再生前～再生始期まで	再生期まで
アオミドロ・藻類による表層はく離	—	発生前

### 〈粒剤〉

●クログワイ、オモダカ、シズイ、コウキヤガラは必要に応じて有効な前処理剤と組み合わせて使用する。また、クログワイ、オモダカに有効な前処理剤と組み合わせて連年施用することにより、さらに効果が向上する。

### 〈ジャンボ〉

●本剤は小包装(パック)のまま10a当り10個の割合で水田に均等に投げ入れる。

## 【薬効・薬害等の注意】 .....

●共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。

●適用作物(稲)への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

●適用外作物(いぐさ、れんこん、せり、くわい)の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

## 【安全対策上の注意】 .....

### 〈粒剤〉

●眼に対して刺激性がある。

●無人航空機散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機(無人ヘリコプター等)による散布・滴下に関する注意事項を参照。

## 【適用と使用方法】 .....

### ① テッケン 1 キロ粒剤

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草 多年生広葉雑草	移植後 15 日～ ノビエ 4 葉期 但し、 収穫 60 日前まで	1kg	湛水散布又は 無人航空機に よる散布	1 回 ※
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ	稲 4 葉期～ ノビエ 4 葉期 但し、 収穫 60 日前まで			

※ベノキスラムを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ベンゾピシクロンを含む農薬の総使用回数：3回以内

### ② テッケン ジャンボ

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ コウキヤガラ	移植後 15 日～ ノビエ 4 葉期 但し、 収穫 60 日前まで	小包装 (パック) 10 個 (500g)	水田に小包装 (パック) のま ま投げ入れる。	1 回 ※
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類によ る表層はく離	稲 4 葉期～ ノビエ 4 葉期 但し、 収穫 60 日前まで			

※ベノキスラムを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ベンゾピシクロンを含む農薬の総使用回数：3回以内