

脂肪酸グリセリド乳剤 サンクリスタル乳剤	取扱メーカー： サンケイ、ホクサン 原体メーカー： サンケイ
成分： デカノイルオクタノイルグリセロール……………90.0%	性状： 淡黄色澄明可乳化油状液体 毒性： 普通物 消防法： 第4類・第4石油類（非水溶性）・危険物等級Ⅲ

【品目特性】……………

- 野菜類のうどんこ病，ハダニ類，アブラムシ類，コナジラミ類を同時に防除できる。
- 薬剤耐性のうどんこ病，薬剤抵抗性のハダニ類，アブラムシ類やコナジラミ類にも有効。
- ミツバチに対する安全性が高く，天敵昆虫の活動にも影響が少ない。
- 有効成分は植物ヤシ油を原料にした食用油脂「脂肪酸グリセリド」で，安全性に優れ，収穫前日まで使用できる。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 散布ムラを生じないように葉裏等にも丁寧に散布する。
- 多発時に効果を高めるために数日間隔で連続散布する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 薬液調製後はできるだけ速やかに散布する。
- かんきつに使用する場合は次の注意事項を守る。
 - 品種，使用時期により果実に薬害を生じるおそれがあるので，事前に安全を確認してから使用する。また樹勢が弱っている場合には散布しない。
 - ジチアノン剤との混用並びに近接散布は果実に薬害を生じるのできける。
- 花き類，観葉植物に使用する場合は，品種，栽培条件等により花卉，苞，葉に薬害を生じる場合があるので，事前に安全を確認して使用する。特に，結蕾期以降の散布は注意する。
- 適用作物（全般，なす，ピーマン，はくさい，チンゲンサイ，花き類・観葉植物）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 共通注意事項6，街路・公園・堤とう等で使用する場合は注意事項を参照。

【適用と使用法】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	脂肪酸グリセリドを含む 農業の総使用回数
野 菜 類 (なす, トマト, ミニトマト, しゅんぎくを 除く)	アブラムシ類 コナジラミ類	300 倍	150 ～ 500 ℓ	前日まで	—	散布	—
	ハダニ類 うどんこ病	300 ～ 600 倍					
な す	アブラムシ類 コナジラミ類	300 倍					
	チャノホコリダニ ハダニ類 うどんこ病	300 ～ 600 倍					
ト マ ト ミニトマト	アブラムシ類 コナジラミ類	300 倍					
	トマトサビダニ ハダニ類 うどんこ病	300 ～ 600 倍					
しゅんぎく	アブラムシ類 コナジラミ類 ハクサイダニ	300 倍					
	ハダニ類 うどんこ病	300 ～ 600 倍					
茶	チャノナガサビダニ カンザワハダニ		摘採前日 まで				
り ん ご ぶ ど う い ち じ く	ハダニ類	600 倍	200 ～ 700 ℓ	前日まで			
かん き つ げ つ き つ	ミカンキジラミ						
花 き 類・ 観 葉 植 物	ハダニ類 うどんこ病		150 ～ 500 ℓ	—			