

クロチアニジン水和剤 ダントツフロアブル	取扱メーカー： 協友アグリ，サンケイ*，住友化学 原体メーカー： 住友化学
成分： クロチアニジン〔ネオニコチノイド系〕……………20.0%	性状： 類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】……………

- ダントツ粉剤DLの項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 使用の際は容器をよく振って均一な状態に戻してから、所定量を取り出す。
- 稲に1250倍希釈で使用する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用する。
- 塗沫処理で使用する場合には、薬剤処理後のものに過酸化カルシウム剤を湿粉衣する。過酸化カルシウム剤の使用上の注意事項を守る。

【安全対策上の注意】……………

- 眼に対して弱い刺激性があるので、眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗する。
- 共通注意事項7. ミツバチに対する注意事項を参照。
- マルハナバチに影響を及ぼすおそれがあるので、注意する。
- 空中散布及び無人航空機散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。



【適用と使用法】

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬 の総使用回数
稲	イナゴ類 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 イネドロオイムシ	5000倍	60～ 150 ℓ	7 日前 まで	3回以内	散布	4 回以内 (直播では種時 又は移植時までの 処理は1回以 内、本田での散 布、空中散布、 無人航空機散布 は合計3回以内)
	ウンカ類 カメムシ類	1250倍	25 ℓ			空中散布	
	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	90倍	3 ℓ			無人航空機 による散布	
	ウンカ類 カメムシ類	24倍	800 ml				
湛水直播 水 稲	イネミズゾウムシ	原液	種もみ 3kg 当り 75 ml	は種前	1 回	塗沫処理	4 回以内 (は種時までの 処理は1回以内、 本田での散布、 空中散布、無人 航空機散布は合 計3回以内)
だい ず	アブラムシ類 カメムシ類 フタスジヒメハムシ マメシンクイガ	2500～ 5000倍	100～ 300 ℓ	7 日前 まで	3回以内	散布	4 回以内 (は種時の土壌混 和は1回以内、散 布は3回以内)
	アブラムシ類 カメムシ類	2500倍	800 ml			無人航空機 による散布	
ばれいしょ	アブラムシ類	5000倍	100～ 300 ℓ	7 日前 まで	3回以内	散布	4 回以内 (植付時の土壌 混和理は1回以 内、植付後は3 回以内)
さとうきび	サトウキビチビアザミウマ カンシャコバネナガカメムシ イナゴ類 カンシャワタアブラムシ	2500～ 5000倍					7 回以内 (植付時までの 処理は1回以内、 植付後の粒剤の 処理は3回以内、 水和剤の処理は 3回以内)
	メイチュウ類	2500倍		30 日前 まで			