

フロルピラウキシフェンベンジル・ペノキスラム・ベンゾピシクロン粒剤 ウィードコア1キロ粒剤	取扱メーカー： 北興、ダウ 原体メーカー： ダウ、ダウ、エス・ディー・エス
成分： フロルピラウキシフェンベンジル〔アリルピコリネート系〕…0.40% ペノキスラム〔スルホニアミド系〕……………0.50% ベンゾピシクロン〔ピシクロオクタン系〕……………2.0%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： －

【品目特性】……………

●ノビエなどの一年生雑草、オモダカ、クログワイ、ホタルイなどの多年生難防除雑草に有効な水稲用中・後期除草剤である。

●新規有効成分フロルピラウキシフェンベンジルを含有する3種混合剤であり、3種類の異なる作用で種々の抵抗性雑草にも高い効果を示す。

●ノビエや生育の進んだ雑草にも高い効果を示し、移植後15日からノビエ4葉期まで使用できる。

●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

●共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。

●ノビエの4葉期までに散布する。

●多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布する。

●前処理剤との体系で使用する。

雑草名	散布適期
クログワイ、コウキヤガラ、シズイ	草丈20cm まで
ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ	4葉期まで
マツバイ	増殖期まで
ミズガヤツリ	5葉期まで
オモダカ	草丈30cm まで
セリ	再生盛期まで
ヒルムシロ	発生盛期まで

【薬効・薬害等の注意】……………

●共通注意事項の5. 水稲除草剤 薬効・薬害等の注意を参照。

●適用作物（水稲）及び適用外作物（いぐさ、れんこん、せり、くわい）への薬害等の注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

●無人航空機散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。

●魚類に影響を及ぼすので、使用时並びに使用後も注意。



【適用と使用法】……………

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稲	一年生雑草 多年生広葉雑草	移植後15日～ ノビエ4葉期 但し、 収穫60日前まで	1kg	湛水散布又は 無人航空機による 散布	2回以内 ※

※フロルピラウキシフェンベンジルを含む農薬の総使用回数：3回以内

※ペノキスラムを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ベンゾピシクロンを含む農薬の総使用回数：3回以内