

エスプロカルブ・ジフルフェニカン乳剤 バンバン乳剤	取扱メーカー： 日産 原体メーカー： 日産、バイエル
成分： エスプロカルブ〔カーバメート系〕……………60.0% ジフルフェニカン〔ニコチンアニリド系〕……………1.5% その他 PRTR 該当成分： ナフタレン〔PRTR・1種〕……………1.2% メチルナフタレン〔PRTR・1種〕……………3.0%	性状： 淡黄色澄明可乳化油状液体 毒性： 普通物 消防法： 第4類・第3石油類（非水溶性）・危険等級Ⅲ

【品目特性】……………

- 問題になっているスルホニルウレア抵抗性スズメノテッポウ、カズノコグサにも優れた効果を示す。
- イネ科から広葉雑草まで幅広い雑草の発生を長期間抑える。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 散布は土壤表面に所定の希釈液を均一にムラなく散布する。
- 碎土、整地は丁寧にを行い、覆土深が2～3 cm 以上となるように細かく砕いた土を用いて丁寧に覆土を行い、鎮圧してから散布する。
- カズノコグサが優占する圃場では、カズノコグサ発生始めまでに400 ml以上の薬量で使用する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 本剤を使用した圃場で後作物を栽培する場合には、耕起を十分に行う。

- 処理後に大量の降雨が予想される場合は使用しない。
- 周辺農作物や有用植物に薬害を生ずるおそれがあるので、飛散しないよう注意して散布する。特に風の強い時の散布はさける。
- 使用後は、タンク、ホース、ノズル内に薬液が残らないよう散布器具は十分に洗浄し、他の用途に使用する場合には薬害の原因にならないよう注意する。
- 適用作物への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 藻類に影響を及ぼすので、使用時は注意。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。



【適用と使用法】……………

作物名	適用雑草名	適用土壌	使用時期	10 a 当り使用量		使用方法	適用地帯	本剤の使用回数
				薬量	希釈水量			
小麦 (秋播)	一年生雑草	全土壌 (砂土を除く)	は種後～小麦2葉期（雑草発生前期まで）	300～400㎖	100ℓ	雑草茎葉散布又は全面土壌散布	北海道	1回 ※
			出芽直後～小麦2葉期（雑草発生始期まで）				全域 (北海道を除く)	
大麦 (秋播)			は種後出芽前（雑草発生前）	300～500㎖		全面土壌散布		

※エスプロカルブを含む農業の総使用回数：1回

※ジフルフェニカンを含む農業の総使用回数：1回