

<b>クレソキシムメチル水和剤</b> <b>ストロビードライフロアブル</b>	<b>取扱メーカー：</b> クミカ、日産、BASF、 日本曹達 <b>原体メーカー：</b> BASF
<b>成分：</b> クレソキシムメチル〔ストロビリン系 PRTR・1種〕…50.0%	<b>性状：</b> 褐色水和性細粒及び微粒 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> —

### 【品目特性】 .....

- 有効成分のクレソキシムメチルはきのこの一種から発見された抗菌活性物質に由来するストロビリン系殺菌剤。
- 幅広い抗菌活性を示し、果樹類のうどんこ病、黒点病、べと病などに高い防除効果を発揮する。
- 予防効果に優れ、また各種病害の胞子形成を強く阻害する。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】 .....

- 使用量に合わせ薬液を調整し、使いきる。
- 発病前～発病初期の使用により安定した防除効果を発揮する。
- 散布液調製の際は、水をかきまぜながら本剤の所定量を徐々に加える。

### 【薬効・薬害等の注意】 .....

- 過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用する。
- ボルドー液との混用はさける。
- 適用作物（なし、ぶどう、かき）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（おうとう）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 共通注意事項8. 適用作物群に関する注意事項を参照。

### 【安全対策上の注意】 .....

- 藻類に影響を及ぼすおそれがあるので、使用時は注意。
- 共通注意事項6. 街路・公園・堤とう等で使用する場合は注意事項を参照。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないように注意する。

### 【適用と使用法】 .....

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	クレソキシムメチルを 含む農薬の総使用回数
かんきつ	そうか病 黒点病 灰色かび病	2000～ 3000倍	200～ 700 ℓ	14日前 まで	3回以内	散布	3回以内
	褐色腐敗病 黄斑病	2000倍					
	そばかす病	2000～ 3000倍					
りんご	炭疽病	3000倍		前日 まで			
	黒点病 黒星病 うどんこ病 モニリア病						
	斑点落葉病 赤星病						
	輪紋病 すす点病 すす斑病 褐斑病	2000～ 3000倍					

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	クレソキシムメチルを 含む農薬の総使用回数																							
なし	輪紋病	2000～ 3000 倍	200～ 700 ℓ	前日まで	3 回以内	散布	3 回以内																							
	黒斑病																													
	うどんこ病																													
黒星病	3000 倍	7 日前まで																												
炭疽病	2000 倍			3 回以内																										
黒星病																														
うどんこ病																														
灰星病																														
もも ネクタリン	縮葉病 (休眠期)	2000 倍		7 日前まで				3 回以内	散布	3 回以内																				
黒斑病																														
黒星病																														
すす斑病																														
うめ	うどんこ病	2000 倍		7 日前まで				3 回以内			散布	3 回以内																		
	灰色かび病																													
	環紋葉枯病																													
炭疽病																														
すもも	環紋葉枯病	2000 倍		7 日前まで				3 回以内					散布	3 回以内																
小粒核果類 (うめ, すもも を除く)	環紋葉枯病																													
ぶどう	黒とう病	2000～ 3000 倍													14 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内												
	べと病																													
	枝膨病																													
	晩腐病																													
かき かき (葉)	灰色かび病	3000 倍		14 日前まで				3 回以内							散布				3 回以内											
	褐色病																													
	うどんこ病																													
	さび病																													
き	うどんこ病	3000 倍		14 日前まで																3 回以内	散布	3 回以内								
	落葉病																													
	炭疽病																													
	灰色かび病																													
キウイフルーツ	灰色かび病	2000～ 3000 倍		前日まで																			3 回以内	散布	3 回以内					
	貯蔵病害 (灰色かび病)	2000 倍																												
	すす斑病	2000 倍		7 日前まで																										
あけび (果 実)	うどんこ病	3000 倍																								14 日前まで	2 回以内	2 回以内		
ブルーベリー	斑点病																													
さび病																														
灰色かび病																														
さんしょう (果 実)	さび病	2000 倍		前日まで																						3 回以内	散布	3 回以内		
炭疽病																														
マンゴー	黒星病	3000 倍		21 日前まで																									3 回以内	3 回以内
バナナ	葉さび病																													
やなぎ	さび病																													
せいようきんしばい	赤星病																													
ぼけ	褐斑病	3000 倍		発病初期																									3 回以内	散布
じんちょうげ	黒点病																													
ポプラ	マルゾニナ落葉病																													