シラフルオフェン・フェリムゾン・フサライド水和剤

ブラシンジョーカーフロアブル

取扱メーカー:

サンケイ*, 北興, 住友化学

原体メーカー:

バイエル, 住友化学, 住友化学

成分: シラフルオフェン·······9.5% フェリムゾン〔ピリミジン系 PRTR・1 種〕······15.0% フサライド〔有機塩素系 PRTR・1 種〕······15.0%

性状:類白色水和性粘稠懸濁液体

毒性:普通物 消防法:——

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	使用方法	総使用回数
	いもち病 ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ	300倍	25 ℓ		散布	
	いもち病 ウンカ類 カメムシ類	8倍	800 mℓ		無人ヘリコ プターによ る散布	
稲	いもち病 ごま葉枯病 想枯れ(ごま葉枯病菌) 変色米 (カーブラリア菌) 変色米 (アルタナリア菌) 変色と (アルタナリア菌) 変色と間 変色が (エ類を知じる が が カーズラリア菌) 変色が (エ類を の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	1000倍	60 ∼ 150 ℓ	14日前 まで	散布	本剤 2回以内 シラフルオフェン 2回以内 フェリムゾン 2回以内 フサライド 3回以内