

<b>イミダクロプリド・スピノサド・イソチアニル粒剤 ルーチンアドスピノ箱粒剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> バイエル, 三井アグロ*, ホクサン  <b>原体メーカー：</b> バイエル, ダウ, 住友化学・バイエル
<b>成分：</b> イミダクロプリド〔ネオニコチノイド系〕……………2.0% スピノサド〔スピノシン系〕……………1.0% イソチアニル〔チアジアゾールカルボキサミド系〕…2.0%	<b>性状：</b> 類白色細粒  <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【適用と使用方法】 .....

作物名	適用病害虫名	1箱*当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲 (箱育苗)	イネアザミウマ	50g	移植2日前 ～移植当日	育苗箱の上 から均一に 散布する。	本剤 1回 イミダクロプリド 3回以内 (移植時までの処理は1回以 内, 本田での散布は2回以内) スピノサド 1回 イソチアニル 3回以内 (移植時までの処理は1回以 内, 本田では2回以内)
	穂枯れ(ごま葉枯病菌) 内穎褐変病		移植当日		
	苗腐敗症(もみ枯細菌病菌) 苗立枯細菌病		は種時 (覆土前)		
	白葉枯病 もみ枯細菌病		は種時 (覆土前) ～ 移植当日		
	イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ イネヒメハモグリバエ イネツトムシ フタオビコヤガ コブノメイガ ニカメイチュウ いもち病				
			は種前	育苗箱の床 土又は覆土 に均一に混 和する。	

\* 育苗箱は 30×60×3cm, 使用土壌約 5 ℓ