

<b>トリシクラゾール・フルトラニル水和剤</b> <b>ビームエイトモンカットフロアブル</b>	<b>取扱メーカー：</b> クミカ、日農  <b>原体メーカー：</b> ダウ、日農
<b>成分：</b> トリシクラゾール〔メラニン生成阻害〕………8.0% フルトラニル〔カルボキシアミド系 PRTR・1種〕…16.0%	<b>性状：</b> 淡黄赤色水和性粘稠懸濁液体 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> —

### 【品目特性】……………

- いもち病に安定した防除効果を示すビーム、紋枯病に優れた効果が長期間持続するモンカットを配剤し、省力的に同時防除できる。
- 無人ヘリコプターでの散布に対応可能。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 希釈倍数250倍で使用する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用する。
- 適用外作物（野菜類の幼苗及びなし（二十世紀、幸水、新水等））の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

### 【安全対策上の注意】……………

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 無人ヘリコプター散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。
- 眼に対して刺激性がある。
- 魚類に影響を及ぼすので使用時ならびに使用後も注意。

### 【適用と使用法】……………

作物名	適用病害名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	トリシクラゾールを含む 農薬の総使用回数	フルトラニルを含む 農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病	1000 倍	60～ 150 ℓ	14 日前 まで	3 回以内	散布	4 回以内 (育苗箱への 処理は 1 回以 内、本田では 3 回以内)	3 回以内 (小包装投入 は 1 回以内)
		250 倍	25 ℓ			無人ヘリ コプター による散 布		
		5～ 8 倍	800 ml					