

<b>CYAP乳剤</b> <b>サイアノックス乳剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> 協友アグリ、ホクサン、住友化学  <b>原体メーカー：</b> 住友化学
<b>成分：</b> CYAP〔有機リン系〕……………50.0% <b>その他 PRTR 該当成分：</b> エチルベンゼン〔PRTR・1種〕……………17%以下 キシレン〔PRTR・1種〕……………17%以下	<b>性状：</b> 淡黄色澄明可乳化油状液体  <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> 第4類・第2石油類（非水溶性）・危険等級III

### 【品目特性】……………

- サイアノックス粉剤の項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- コナガ、アオムシ、ヨトウムシに使用する場合には若齢幼虫のうちに散布する。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 石灰硫黄合剤、ボルドー液などアルカリ性薬剤との混用はさける。
- 適用作物（はくさい）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

### 【安全対策上の注意】……………

- 共通注意事項7. ミツバチに対する注意事項を参照。



### 【適用と使用法】……………

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用用量	使用時期 (収穫前)	本剤及びCYAPを 含む農薬の総使用回数	使用 方法	
キャベツ	アオムシ ヨトウムシ(若～中齢幼虫) タマナギンウワバ アブラムシ類	1000～ 1500倍	100～ 300 ℓ	21日前まで	2回以内	散布	
	コナガ キスジノミハムシ成虫	1000～ 2000倍					
はくさい だいこん	アオムシ ヨトウムシ(若～中齢幼虫) タマナギンウワバ アブラムシ類	1000～ 1500倍		14日前まで			
	コナガ キスジノミハムシ成虫	1000～ 2000倍					
きゅうり	アブラムシ類 アザミウマ類	1000倍		収穫開始 3日前まで			
なす	テントウムシダマシ			前日まで			
ねぎ	アザミウマ類	500～ 1000倍		21日前まで			
たまねぎ				14日前まで	3回以内		
いんげんまめ	マメシクイガ フキノメイガ インゲンテントウ	1000倍		7日前まで	2回以内		
だいず	マメシクイガ フキノメイガ			21日前まで			
あずき							
ばら	アブラムシ類			—	6回以内		