

<b>フェリムゾン・フサライド水和剤</b> <b>ブラシン水和剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> サンケイ＊，住友化学  <b>原体メーカー：</b> 住友化学，住友化学
<b>成分：</b> フェリムゾン〔PRTR・1種〕……………30.0% フサライド〔有機塩素系 PRTR・1種〕……………20.0% <b>その他 PRTR 該当成分：</b> ポリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテル〔PRTR・1種〕…3.5%以下	<b>性状：</b> 類白色水和性粉末63μm以下 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【品目特性】……………

- ブラシン粉剤DLの項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- ブラシン粉剤DLの項参照。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 適用外作物（たばこ，けいとう，だいず，あずき，いんげんまめ）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

### 【安全対策上の注意】……………

- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。



### 【適用と使用法】……………

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	フェリムゾンを含む 農薬の総使用回数	フサライドを含む 農薬の総使用回数
稲	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 穂枯れ (すじ葉枯病菌) 墨黒穂病 変色米 (カーブラリア菌) 変色米 (エビコッカム菌) 変色米 (アルタナリア菌)	1000 倍	60 ～ 150 ℓ	7 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内	3 回以内