

シラフルオフェン・トリシクラゾール・バリダマイシン・フェリムゾン粉剤 ノンブラスバリダジョーカー粉剤 DL		取扱メーカー： 協友アグリ，サンケイ* 原体メーカー： バイエル，ダウ，住友化学， 住友化学
成分：シラフルオフェン.....0.50% トリシクラゾール.....0.50% バリダマイシンA〔抗生物質〕.....0.30% フェリムゾン〔PRTR・1種〕.....2.0%		性状：類白色粉末45μm以下， 浮遊性指数20以下 毒性：普通物 消防法：——

【適用と使用方法】

作物名	適用病害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	使用方法	総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 ごま葉枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) ウンカ類 ツマグロヨコバイ コブノメイガ カメムシ類	3～4 kg	14 日前 まで	散布	本剤 2 回以内 シラフルオフェン 2 回以内 トリシクラゾール 4 回以内 (育苗箱への処理は 1 回以 内，本田では 3 回以内) バリダマイシン 6 回以内 (育苗箱灌注は 1 回以内， 本田では 5 回以内) フェリムゾン 2 回以内