

<b>ピラゾレート・プロピリスルフロロン粒剤 キケンジャー Z (1キロ粒剤 / ジャンボ / フロアブル)</b>	<b>取扱メーカー：</b> 三井アグロ  <b>原体メーカー：</b> 三井アグロ、住友化学
<b>成分：</b> ピラゾレート〔ピラゾール系 PRTR・1種〕 ……15.0% (粒剤), 30.0% (ジャンボ), 27.3% (フロアブル) プロピリスルフロロン〔スルホニルウレア系〕 ……0.9% (粒剤), 1.8% (ジャンボ), 1.6% (フロアブル)	<b>性状：</b> 類白色細粒 (粒剤) 淡褐色粒状、水溶性パック入り 1パック50g (ジャンボ) 類白色水性和性粘稠懸濁液体 (フロアブル)  <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> —

## 【品目特性】…………… 〈共通〉

- 水稲用初・中期一発処理除草剤。
- スルホニルウレア抵抗性雑草 (ホタルイ、コナギ、アゼナ等) にも高い効果を示す。
- ノビエ3葉期まで、一年生雑草や主要な多年生雑草に効果を示す。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

## 【使用上のポイント】…………… 〈共通〉

- 雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期までに時期を失ないように散布する。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意する。

雑草名	散布適期		
	粒剤	ジャンボ	フロアブル
ホタルイ	3葉期まで		
ウリカワ ミズガヤツリ	3葉期まで (直播水稲は 2葉期まで)	3葉期まで	
ヒルムシロ	発生期まで (直播水稲は発 生始期まで)	発生期まで	
ヘラオモダカ	3葉期まで	2葉期まで	—
クログワイ オモダカ	発生前～発生始期まで		
コウキヤガラ	発生始期まで		
セリ	再生前～再生始期まで		
シズイ	草丈3cmまで		
アオミドロ・ 藻類による 表層はく離	発生前まで	—	

- 共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。

- 散布後少なくとも3～4日間は通常の湛水状態を保つ。

- クログワイ、オモダカは必要に応じて有効な後処理剤と組み合わせて使用する。

- 移植前に生育したミズガヤツリには効果が劣るので、物理的防除方法などを用いて移植前に防除してから使用する。

- コウキヤガラ、シズイは必要に応じて有効な後処理剤と組み合わせて使用する。

- 移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用する場合には、雑草の発生状況をよく観察し、時期を失ないように適期に散布する。

- 散布後に多量の雨が予想される場合は除草効果が低下することがあるので使用をさける。

## 〈ジャンボ〉

- 小包装 (パック) のまま10 a 当り10個の割合で水田に均等に投げ入れる。

## 【薬効・薬害等の注意】…………… 〈共通〉

- 補植は必ず散布前に行う。

- 九州、南四国などの暖地で移植期が遅く、処理後著しい高温が続く場合には、砂壤土では稲にクロロシスを生ずる場合があるが、その後の生育に対する影響は認められていない。

- 共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。

- 適用作物 (水稲) の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

- 適用外作物 (いぐさ、れんこん、せり、くわい) への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。このような作物の隣接田で使用する場合は十分注意。

### 〈粒剤〉

●直播水稻栽培で使用する場合は、稲の根が露出する条件では薬害を生じるおそれがあるので、使用をさける。

### 【安全対策上の注意】 .....

#### 〈共通〉

●カブレやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

#### 〈粒剤〉

●蚕に影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。

●眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。

●無人ヘリコプター散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。

### 〈ジャンボ〉

●水溶性フィルム包装が破袋した場合は以下の点に注意する。

○眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。

#### 〈フロアブル〉

●無人ヘリコプター滴下の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。

#### 〈共通〉



### 【適用と使用法】 .....

#### ①キクンジャー Z 1 キロ粒剤

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ シズイ コウキヤガラ アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植時	1 kg	田植同時散布機で施用	1 回 ※
		移植直後～ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで		湛水散布 又は無人ヘリコプター による散布	
直播水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ	稲1葉期～ノビエ3葉期 但し、 収穫90日前まで			

※ピラゾレートを含む農薬の総使用回数：2回以内

※プロピリスルフロンを含む農薬の総使用回数：2回以内

## ②キクンジャー Z ジャンボ

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稲	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ シズイ コウキヤガラ	移植後 5 日～ ノビエ 3 葉期 但し、 移植後 30 日まで	小包装 (バック) 10 個 (500g)	水田に小包装(バック)のまま投げ入れる。	1 回 ※

※ピラゾレートを含む農薬の総使用回数：2 回以内

※プロピリスルフロンを含む農薬の総使用回数：2 回以内

## ③キクンジャー Z フロアブル

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稲	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ シズイ コウキヤガラ	移植後 5 日～ ノビエ 3 葉期 但し、 移植後 30 日まで	500 ml	原液湛水散布, 水口施用又は 無人ヘリコプ ターによる滴 下	1 回 ※

※ピラゾレートを含む農薬の総使用回数：2 回以内

※プロピリスルフロンを含む農薬の総使用回数：2 回以内