

フェントラザミド・プロモブチド・ベンスルフロンメチル剤 クサトリー DX (1キロ粒剤51/ジャンボL/フロアブルL)	取扱メーカー： 三井アグロ 原体メーカー： バイエル、住友化学、クミカ
成分： フェントラザミド〔テトラゾリノン系 PRTR・1種〕3.0% (粒剤), 7.5% (ジャンボ), 6.0% (フロアブル) プロモブチド〔酸アミド系〕6.0% (粒剤), 15.0% (ジャンボ), 18.0% (フロアブル) ベンスルフロンメチル〔スルホニルウレア系〕0.51% (粒剤), 1.27% (ジャンボ), 1.0% (フロアブル)	性状： 類白色細粒 (粒剤) 淡褐色粒状、水溶性パック入り 1パック40g (ジャンボ) 類白色水和性粘稠懸濁液体 (フロアブル) 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】

〈共通〉

- ノビエを始めとする一年生雑草や主要な多年生雑草に優れた効果を発揮する。アオミドロ・藻類による表層はく離に対して発生防止効果がある。
- スルホニルウレア系除草剤に抵抗性を獲得した雑草 (ホタルイ類, アゼナ類, コナギ等) に対して安定した効果が期待できる。
- 3種の有効成分を配合したノビエ2.5葉期まで処理できる初中期一発型除草剤である。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

〈ジャンボ〉

- 畦畔から10a当り10パックを投げ込むだけで処理は完了する。

【使用上のポイント】

〈共通〉

- 雑草の発生前から生育初期に有効なのでノビエの2.5葉期までに時期を失ないように散布する。
- 散布後少なくとも3～4日間は通常の湛水状態を保つ。
- 多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布する。

雑草名	散布適期		
	粒剤	ジャンボ	フロアブル
ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ	2葉期まで		
ヒルムシロ	発生前まで		
セリ	再生始期まで		
アオミドロ・ 藻類による表 層はく離	発生前		

- 移植前に生育したミズガヤツリには効果が劣るので、物理的防除方法などで移植前に防除する。
- 移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用する場合には、雑草の発生状況をよく観察し、時期を失しないよう適期に散布する。

- 共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。

〈ジャンボ〉

- パックは破らずにそのまま投げ入れる。
- 田植後3～12日が使用適期。

【薬効・薬害等の注意】

〈共通〉

- 共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- 補植は必ず使用前に行う。
- 適用作物 (水稲) の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物 (いぐさ, れんこん, セリ, くわい) への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】

〈共通〉

- 藻類に影響を及ぼすので、使用時は注意。
- カブレやすい人は取り扱いに注意する。

〈ジャンボ〉

- 水溶性フィルム包装が破袋した場合は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないように注意する。眼に入った場合は水洗いし、眼科医の手当を受ける。
- 吸湿性があるので湿気には十分注意し、使い残りは外袋の口を強く閉じて保管する。また、水溶性フィルムが劣化するおそれがあるので下積にならないようにする。

〈フロアブル〉

●眼に刺激性があるので眼に入った場合は直ちに
水洗し、眼科医の手当を受ける。

【適用と使用法】.....

①クサトリー DX 1キロ粒剤51

作物名	適用雑草名	適用土壌	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	適用地帯	本剤の 使用回数
移植 水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類 による表層はく離 (九州)	砂壤土～ 埴土	移植時	1kg	田植同時 散布機で 施用	全域（北海道， 東北を除く）の 普通期及び早期 栽培地帯	1回※
			移植直後～ ノビエ2.5葉期 但し，移植後 30日まで		湛水散布		

※フェントラザミドを含む農薬の総使用回数：1回

※プロモブチドを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ペンシルフロンメチルを含む農薬の総使用回数：2回以内

②クサトリー DX ジャンボ L

作物名	適用雑草名	適用 土壌	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	適用地帯	本剤の 使用回数
移植 水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ アオミドロ・ 藻類による表層 はく離	砂壤土 ～埴土	移植後3日～ ノビエ2.5葉期 但し，移植後 30日まで	小包装 (パック) 10個 (400g)	水田に小包 装(パック) のまま投げ 入れる。	全域（北海道， 東北を除く）の 普通期及び早期 栽培地帯	1回※

※フェントラザミドを含む農薬の総使用回数：1回

※プロモブチドを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ペンシルフロンメチルを含む農薬の総使用回数：2回以内

③クサトリー DX フロアブル L

作物名	適用雑草名	適用 土壌	使用時期	10 a 当り 使用量	使用 方法	適用地帯	本剤の 使用回数
移植 水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ（北陸を除く） アオミドロ・藻類に よる表層はく離（関 東以西）	砂壤土 ～埴土	移植時	500 ml	田植同時 散布機で 施用	全域（北海道， 東北を除く）の 普通期及び 早期栽培地帯	1回※
			移植直後～ ノビエ2.5葉期 但し，移植後 30日まで		原液湛水 散布		

※フェントラザミドを含む農薬の総使用回数：1回

※プロモブチドを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ペンシルフロンメチルを含む農薬の総使用回数：2回以内