

<b>ジメテナミドP・ペンディメタリン乳剤</b> <b>モーティブ乳剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> B A S F  <b>原体メーカー：</b> B A S F, B A S F
<b>成分：</b> ジメテナミドP〔酸アミド系〕……………19.7% ペンディメタリン〔ジニトロアニリン系 PRTR・1種〕…23.1% <b>その他 PRTR 該当成分：</b> ドデシルベンゼンスルホン酸カルシウム〔PRTR・1種〕…4.2%	<b>性状：</b> 暗褐色可乳化油状液体  <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> 第4類・第3石油類（非水溶性）・危険等級III

### 【品目特性】……………

●ジメテナミドPとペンディメタリンを効率よく混用した土壌処理除草剤で、広い範囲の雑草に高い効果を示す。

●雑草の発生前～発生初期の土壌処理で、1～2カ月間雑草の発生を抑え、安定した効果が期待できる。

●有効成分の特性は、参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

●雑草の生育が進むと効果が劣るので、時期を逸しないように散布する。

●砕土・整地は丁寧に行い、は種後に使用する場合、種子が露出しないように覆土はできるだけ丁寧に行う。

●激しい降雨が予想される時には使用をさける。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

●とうもろこしのマルチ栽培では薬害を生じるおそれがあるので使用しない。

### 【安全対策上の注意】……………



### 【適用と使用方法】……………

作物名	適用雑草名	適用土壌	使用時期	10 a 当り使用量		使用方法	適用 地帯	本剤の 使用回数
				薬量	希釈水量			
とうもろこし 飼料用とうもろこし	一年生雑草	全土壌 (砂土を 除く)	は種後～ とうもろこし2葉期 (イネ科雑草 2葉期まで)	200～ 400 ml	100～ 150 ℓ	全面土壌 散布	全域	1 回※
たまねぎ			定植前 (雑草発生前)		100 ℓ			
			定植後 (雑草発生前) 但し、 定植45日後まで					
ばれいしょ			植付後萌芽前 (雑草発生前)	70～ 150 ℓ				

※ジメテナミド及びジメテナミドPを含む農薬の総使用回数：1回  
 ※ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数：1回