

テフリルトリオン・フェントラザミド剤 ボデーガード (1キロ粒剤 / ジャンボ / フロアブル)	取扱メーカー： クミカ、バイエル、ホクサン 原体メーカー： 全農・バイエル・北興、バイエル
成分： テフリルトリオン〔トリケトン系〕 ……3.0% (粒剤), 7.5% (ジャンボ), 5.8% (フロアブル) フェントラザミド〔テトラゾリノン系 PRTR・1種〕 ……3.0% (粒剤), 7.5% (ジャンボ), 5.8% (フロアブル)	性状： 類白色細粒 (粒剤) 褐色細粒, 水溶性バック入り 1バック40g (ジャンボ) 類白色水和性粘稠懸濁液体 (フロアブル) 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】…………… 〈共通〉

- テフリルトリオンとフェントラザミドの2種混合の一発処理除草剤である。
- ほとんど全ての一年生雑草、多年生雑草に高い効果を示し、オモダカ、クログワイなどの難防除雑草に対しても有効である。
- スルホニルウレア抵抗性雑草やイボクサ、クサネムなどの特殊雑草にも有効である。
- 約40～50日の残効性を有し、通常の圃場条件下では1回の散布で雑草防除ができる。
- 水稻に対する選択性が高く、通常の圃場条件下では安心して使用できる (砂質土壌や漏水田での使用はさける)。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】…………… 〈共通〉

- 共通注意事項の5. 水稻除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- 直播水稻に使用する場合は、薬害をさけるため稲の1葉期以降に使用し、稲の根が露出している時の使用はさける。

- 多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布する。

雑草名	散布適期		
	粒剤	ジャンボ	フロアブル
ホタルイ	2葉期まで		3葉期まで
ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ エゾノサヤヌカガサ	2葉期まで		
ヒルムシロ	発生期まで		
セリ	再生前～再生始期まで		
オモダカ クログワイ コウキヤガラ	発生始期まで		
シズイ	草丈3cmまで	発生始期	

〈粒剤〉

- 雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期 (移植栽培)、2.5葉期 (直播水稻) までに、時期を失ないように散布する。

〈ジャンボ〉

- 雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに、時期を失ないように散布する。

- 小包装 (バック) のまま10a当り10個の割合で水田に均等に投げ入れる。

〈フロアブル〉

- 雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期までに、時期を失ないように散布する。
- 使用前によく振ってから使用する。

【薬効・薬害等の注意】……………
 〈共通〉

- 共通注意事項の5. 水稻除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- 適用作物（水稻）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（いぐさ、れんこん、せり、くわい）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………
 〈粒剤・フロアブル〉

- 無人ヘリコプター散布・滴下の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。



【適用と使用法】……………

①ボデーガード1キロ粒剤

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ	移植時	1kg	田植同時散布機で施用	1回 ※
	セリ クログワイ オモダカ エゾノサヤマカグサ シズイ コウキヤガラ	移植直後～ ノビエ3 葉期 但し、 移植後30日まで			
直播水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ	稲1 葉期～ ノビエ2.5 葉期 但し、 収穫90日前まで			

※テフリトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※フェントラザミドを含む農薬の総使用回数：1回

②ボデーガードジャンボ

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ エゾノサヤヌカグサ コウキヤガラ シズイ	移植後5日～ ノビエ2.5葉期 但し、 移植後30日まで	小包装 (パック) 10個 (400g)	水田に 小包装 (パック) のまま投 げ入れる。	1回 ※
直播水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ノビエ2.5葉期 但し、 収穫90日前まで			

※テフリトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※フェントラザミドを含む農薬の総使用回数：1回

③ボデーガードフロアブル

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ エゾノサヤヌカグサ コウキヤガラ シズイ	移植後5日～ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで	500 ml	原液湛水散 布又は水口 施用又は無 人ヘリコプ ターによる 滴下	1回 ※
直播水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ	稲1葉期～ ノビエ3葉期 但し、 収穫90日前まで		原液湛水散 布又は無人 ヘリコプタ ーによる滴 下	

※テフリトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※フェントラザミドを含む農薬の総使用回数：1回