

メタフルミゾン水和剤 アクセルフロアブル	取扱メーカー： 石原、日農 原体メーカー： 日農
成分： メタフルミゾン〔セミカルバザン系〕……………25.0% その他 PRTR 該当成分： ポリ(オキシエチレン)＝アルキルエーテル〔PRTR・1 種〕…1.3%	性状： 類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】……………

- チョウ目害虫，特に大型チョウ目害虫に高い効果を示す。
- 大きく生育した老齢幼虫にも高い効果を示す。
- 有機リン剤，カーバメート剤，合成ピレスロイド剤，IGR 剤，マクロライド系剤，ネオニコチノイド剤とは異なる新規構造を有し，ローテーション散布の 1 剤として有効である。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 植物体への浸透移行による効果は弱いので，かけ残しのないように葉の表裏に十分散布する。
- クビアカツヤカミキリに使用する場合は，被害樹の加害痕である木屑排出孔の木屑を除去した後，に排出孔内に薬液が滴るまで注入する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 共通注意事項 8，適用作物群に関する注意事項を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 共通注意事項 7，ミツバチに対する注意事項を参照。
- 蚕に対して影響があるので，周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 眼に対して刺激性がある。
- 樹幹注入の際は手袋などを着用する。
- 共通注意事項 6，街路・公園・堤とう等で使用する場合の注意事項を参照。
- 無人航空機散布の際は，共通注意事項の 2，空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。

【適用と使用法】

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	メタフルミゾンを含 む農薬の総使用回数		
かんきつ	ゴマダラカミキリ	200倍	5～ 200 ℓ	7日前 まで	3回以内	主幹から 株元に散 布	3回以内		
	アゲハ類 ヨモギエダシャク クワノミハムシ	1000～ 2000倍	200～ 700 ℓ						
キウイフルーツ	ケムシ類	1000倍		前日まで					
うめ	ケムシ類 クビアカツヤカミキリ ケシキスイ類					1000～ 2000倍			
	とうもろこし		アワノメイガ					100～ 300 ℓ	
アスパラガス	ハスモンヨトウ	100～ 800 ℓ							
ごぼう		ヒョウタンゾウムシ類	1000倍						
トマト ミニトマト	オオタバコガ ハスモンヨトウ	1000～ 2000倍	2回以内			散布		2回以内	
ピーマン	オオタバコガ								
なす	オオタバコガ ニジュウヤホシテントウ ハスモンヨトウ								
	にんじん	ハスモンヨトウ ヒョウタンゾウムシ類							1000倍
ねぎ	シロイチモジヨトウ	1000～ 2000倍			3回以内		3回以内		
ほうれんそう	ハスモンヨトウ シロオビノメイガ ウリハムシモドキ	1000倍							
	キャベツ			コナガ アオムシ キスジノミハムシ					1000～ 2000倍
				ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ オオタバコガ ヨトウムシ ウワバ類					
はくさい		コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ ダイコンサルハムシ		1000倍					
	ヨトウムシ ハスモンヨトウ カブラハバチ	1000～ 2000倍							
	レタス 非結球レタス	ハスモンヨトウ オオタバコガ		1000～ 2000倍					2回以内
ブロッコリー	ヨトウムシ ハスモンヨトウ								
	コナガ	1000倍							

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	メタフルミゾンを含む 農薬の総使用回数
非結球あぶら な科葉菜類	コナガ キスジノミハムシ	1000倍	100～ 300 ℓ	前日まで	3回以内	散布	3回以内
	ハスモンヨトウ	2000倍					
だいこん	キスジノミハムシ ダイコンサルハムシ	1000倍		7日前 まで	2回以内		2回以内
	ハイマダラノメイガ ヨトウムシ カブラハバチ	1000～ 2000倍					
かぶ	コナガ アオムシ キスジノミハムシ	1000倍		3日前 まで			
えだまめ だいず	ハスモンヨトウ	1000～ 2000倍	1.6 ℓ	前日まで	3回以内	無人航空 機による 散布	3回以内
	フタスジヒメハムシ	1000倍					
しょうが	ハスモンヨトウ アワノメイガ	1000～ 2000倍	100～ 300 ℓ	発生初期	6回以内	散布	6回以内
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ ヨツモンカメノコハムシ	10～16倍	200～ 700 ℓ	成虫発生 直前～成 虫発生期	6回以内	主幹から 株元に 散布	6回以内
さといも	ハスモンヨトウ	1000～ 2000倍					
食用ミニバラ	オオタバコガ	1000倍	—	—	—	木屑排出 孔を中心 に薬液が 滴るまで 樹幹注入	
きく	オオタバコガ シロイチモジヨトウ	1000～ 2000倍					
花き類・ 観葉植物 (きくを除く)	オオタバコガ	1000倍	100倍				
樹木類 (さくらを除く)	ケムシ類	1000～ 4000倍					
さくら	クビアカツヤカミキリ	1000倍	5～ 200 ℓ				
		200倍					
たばこ	ヨトウムシ	1000～ 2000倍	25～ 180 ℓ	10日前 まで	2回以内	散布	2回以内
	タバコアオムシ	2000倍					