

ピラゾレート・ベンゾビスシクロン・メタゾスルフロン粒剤 ジカマック500グラム粒剤	取扱メーカー： 三井アグロ 原体メーカー： 三井アグロ、エス・ディー・エス、 日産
成分： ピラゾレート〔ピラゾール系 PRTR・第1種〕…10.0% ベンゾビスシクロン〔ビスシクロオクタン系〕……………2.0% メタゾスルフロン〔スルフォニルウレア系〕……………0.60%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- 直播水稻の、は種時又はは種直後処理専用、除草剤。
- 10 a 当たり 500 g で処理でき、作業性に優れる。
- SU 抵抗性雑草（ホタルイ、コナギ、アゼナなど）に効果を発揮する。
- は種直後の無人航空機による散布も可能。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 共通注意事項の 5、水稻除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- 雑草の発生前から発生初期に有効なので時期を失ないように散布する。
- は種時又はは種直後に通常の湛水状態より水を落として散布する場合、散布後速やかに入水し、通常の湛水状態（水深 3cm 程度）にする。
- 止水期間中の入水は静かに行う。

雑草名	散布適期
ノビエ	1.5 葉期
ホタルイ	1 葉期
ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	発生始期まで

【薬効・薬害等の注意】……………

- 共通注意事項の 5、水稻除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- 後処理剤との体系で使用する。
- 砂質土壌の水田及び漏水田（減水深 2 cm / 日以上）では、薬害が生じるおそれがあるので使用をさける。
- いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これら作物の生育期に隣接田で使用する場合は、十分注意する。
- 蚕に影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。

【安全対策上の注意】……………

- 眼に刺激性があるので、眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- 無人航空機散布の際は、共通注意事項の 2、空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。
- 吸湿性しやすいので開封後は固く口を閉じ、長期間の保管はさける。

【適用と使用法】

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	は種時	500g	は種同時散布機で施用	1回 ※
		は種直後～ノビエ 1.5 葉期 但し、収穫90 日前 まで		湛水散布又は無人航空機 による散布	

※ピラゾレートを含む農薬の総使用回数：2 回以内

※ベンゾピシクロンを含む農薬の総使用回数：3 回以内

※メタゾスルフロンを含む農薬の総使用回数：2 回以内