

イミダクロプリド・クロラントラニプロール・イソチアニル粒剤 ルーチントレス箱粒剤	取扱メーカー： バイエル、ホクサン 原体メーカー： バイエル、FMC、 住友化学・バイエル
成分： イミダクロプリド〔ネオニコチノイド系〕………2.0% クロラントラニプロール〔アントラニリックジアミド系〕…0.75% イソチアニル〔チアジアゾールカルボキサミド系〕…2.0%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： ——

【適用と使用方法】

作物名	適用病害虫名	1箱*当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲 (箱育苗)	苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌)	50g	は種前	育苗箱の床土 又は覆土に均 一に混和する。	本剤 1回 イミダクロプリド 3回以内 (移植時までの処理は1回以 内、本田での散布は2回以内) クロラントラニプロール 1回 イソチアニル 3回以内 (移植時までの処理は1回以 内、本田では2回以内)
	イネアザミウマ イネツトムシ ツマグロヨコバイ ウンカ類 イネヒメハモグリバエ イネミズゾウムシ イネドロオイムシ コブノメイガ ニカメイチュウ フタオビコヤガ いもち病				
	穂枯れ(ごま葉枯病菌) 白葉枯病 もみ枯細菌病		は種時 (覆土前) ～移植当日	育苗箱の上か ら均一に散布 する。	
	苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌)				
	内穎褐変病		は種時 (覆土前) 移植当日		

* 育苗箱は 30×60×3cm、使用土壌約 5ℓ