

ピリダベン水和剤 サンマイトフロアブル	取扱メーカー： 日産，琉産 原体メーカー： 日産
成分： ピリダベン〔PRTR・1 種〕……………20.0%	性状： 淡褐色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 劇物 消防法： ——

【品目特性】……………

- ハダニ類の他にカメムシ目害虫やチャノキイロアザミウマなどの害虫に対して高い効果を示す。
- フロアブル剤なので薬液が容易に調製でき、収穫物の汚れも少ない。
- その他サンマイト水和剤の項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- サンマイト水和剤の項参照。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 使用前によく振ってから使用する。
- 茶に使用する場合、1～2 葉期における銅水和剤との混用は薬害を生じるおそれがあるので、混用はさける。

- その他サンマイト水和剤の項参照。

- 適用作物（きゅうり，メロン，さといも）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

- 適用外作物（なす）への薬害などの注意は、「薬害注意事項解説」を参照。

- 共通注意事項 8. 適用作物群に関する注意事項を参照。

【安全対策上の注意】……………

- サンマイト水和剤の項参照。

【適用と使用方法】……………

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	ピリダベンを含む 農薬の総使用回数
かんしょ	ハダニ類 コナジラミ類	1000～ 1500 倍	100～ 300 ℓ	前日まで	2 回以内	散布	2 回以内
さといも	ハダニ類			21 日前 まで			
えだまめ	コナジラミ類	1000 倍		14 日前 まで	1 回		1 回
あずき	ハダニ類	1000～ 2000 倍		7 日前 まで	2 回以内		2 回以内
きゅうり	ハダニ類	1000～ 1500 倍		前日まで			
すいか メロン	コナジラミ類 アブラムシ類 うどんこ病			3 日前 まで			
かぼちゃ	コナジラミ類 うどんこ病						
うり類 (漬物用,但し, しろうりを除く)	アブラムシ類 ハダニ類			前日まで			

