

ペルメトリン粒剤 ガードベイト A	取扱メーカー： サンケイ，ホクサン，琉産 原体メーカー： 住友化学
成分： ペルメトリン〔ピレスロイド系〕……………0.1%	性状： 淡赤色粒状 径3mm 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- ペルメトリンにネキリムシ類の誘引物質を配合した誘引殺虫剤である。
- ピレスロイドの特長である速効的な殺虫作用により，優れた被害防止効果を発揮する。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【安全対策上の注意】……………

- アディオン水和剤の項参照。
- 家さん，家畜，ペット等が誤食しないように注意する。



【使用上のポイント】……………

- ネキリムシ類は作物の地際部を加害するので，作物の株元に散布する。

【適用と使用法】……………

作物名	適用害虫名	10a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	ペルメトリンを含む 農薬の総使用回数
はくさい ごぼう	ネキリムシ類	3kg	は種時～生育初期	5回以内	株元散布	5回以内
だいこん				4回以内		4回以内
オクラ				3回以内		3回以内
キャベツ			生育初期	5回以内		5回以内 (株元灌注は 2回以内)
レタス ブロッコリー カリフラワー				5回以内		5回以内
なす トマト				3回以内		3回以内
ミニトマト				1回		1回
ピーマン いちご たまねぎ かんしょ やまのいも さといも				5回以内		5回以内
とうもろこし ばれいしょ				4回以内		4回以内

作物名	適用害虫名	10a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	ベルメトリンを含む 農薬の総使用回数
な ば な 類 ね け ぎ わ さ つ ぎ 豆類(未成熟)	ネキリムシ類	3kg	生育初期	3回以内	株元散布	3回以内
そ ら ま め				5回以内		5回以内
だ い ず				2回以内		2回以内
ぎ ゆ う り			生育初期 但し 収穫開始7日前まで	3回以内		6回以内 (乳剤は3回 以内, 粒剤は 3回以内)
か ぼ ち や				5回以内		5回以内
ほ う れ ん そ う			生育初期 但し 収穫7日前まで	3回以内		3回以内
し ゅ ん ぎ く				2回以内		2回以内
ズッキーニ			生育初期 但し 収穫14日前まで	2回以内		2回以内
に ん じ ん				4回以内		4回以内
もりあざみ			定植時～発芽期 但し 収穫120日前まで	2回以内		2回以内
エンサイ				2回以内		2回以内
飼料用とうもろこし (青刈り) ヤングコーン			定植時 但し 収穫21日前まで	2回以内		2回以内
葉しょうが				2回以内		2回以内
しょうが			生育初期 但し 収穫90日前まで	4回以内		4回以内 (乳剤は2回 以内, 粒剤は 2回以内)
エンダイブ				4回以内		4回以内 (散布は2回 以内)
に ん に く			3日前まで	3回以内		3回以内
か ぶ				2回以内		2回以内
に ら (花茎)			前日まで	2回以内		2回以内
アスパラガス				3回以内		3回以内
パ セ リ			7日前まで	3回以内		3回以内
は っ か				3回以内		3回以内
し そ			30日前まで	4回以内		4回以内
とうがらし類				6回以内		6回以内
食用おおばこ(種子)			生育初期	1回		1回
ら っ か せ い			定植時			
いんちんこう						
び ゃ く し						
花き類・観葉植物						
た ば こ						