

オキシリニック酸・カスガマイシン水和剤 カセット水和剤	取扱メーカー： 北興 原体メーカー： 住友化学，北興
成分： オキシリニック酸……………10.0% カスガマイシン塩酸塩〔抗生物質〕……………2.9% （カスガマイシンとして……………2.5%）	性状： 類白色水和性粉末45μm以下 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】……………

- カスガマイシンとオキシリニック酸を配合することにより，細菌性病害により安定した高い効果を発揮する。
- 銅を含まない細菌性病害用殺菌剤であり，銅の使用できない作物，時期にも幅広く使用できる。
- 作用特性はスターナ水和剤，カスミン液剤の項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【薬効・薬害等の注意】……………

- キャベツの軟腐病及び黒腐病に使用する場合，多発条件下では効果が劣る場合があるので注意する。

【適用と使用法】……………

作物名	適用病害名	希釈 倍数	10 a 当り 使用用量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	オキシリニック酸を含む 農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む 農薬の総使用回数
キャベツ	黒腐病 黒斑細菌病	1000倍	100～ 300ℓ	7日前まで	3回以内	散布	3回以内	4回以内
たまねぎ	軟腐病			14日前まで	5回以内		5回以内	5回以内
ねぎ							3回以内	2回以内
にんにく	春腐病							5回以内
レタス	軟腐病 腐敗病			7日前まで	2回以内		2回以内	4回以内
非結球レタス	斑点細菌病			21日前まで				
ばれいしょ	軟腐病			7日前まで	3回以内		5回以内 (種いも浸漬は1回以内)	4回以内 (種いも浸漬は1回以内，植付後は3回以内)
	そうか病	30倍	—	植付前	1回	種いも瞬間浸漬		
はくさい	軟腐病 黒斑細菌病	1000倍	100～ 300ℓ	21日前まで	2回以内	散布	3回以内	2回以内
ブロッコリー	黒腐病						2回以内	4回以内
だいこん	軟腐病 黒斑細菌病			14日前まで	3回以内		5回以内	3回以内

- ばれいしょの種いも浸漬に使用する場合，薬害が生じるおそれがあるので，萌芽後や種いも切断後の使用はさける。なお，本剤の処理により，軽度の萌芽遅延を認めることがあるが，その後の生育には影響は見られない。

- 適用外作物（れんこん，だいず）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

