

オキサジクロメホン・テフリルトリオン・ピラクロニル剤 ジェイフレンド (1キロ粒剤 / フロアブル)	取扱メーカー： 協友アグリ 原体メーカー： 全農、全農・バイエル・北興、 協友アグリ
成分： オキサジクロメホン〔オキサジノン系〕0.3% (粒剤), 0.57% (フロアブル) テフリルトリオン〔トリケトン系〕3.0% (粒剤), 5.7% (フロアブル) ピラクロニル2.0% (粒剤), 3.8% (フロアブル)	性状： 類白色細粒 (粒剤) 類白色水和性粘稠懸濁液体 (フロアブル) 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】

〈共通〉

- 総合効果に優れるスルホニルウレア系有効成分を含まない一発処理除草剤である。
- スルホニルウレア (SU) 抵抗性雑草に対しても安定して高い効果を示す。
- 効果の発現が非常に速く、長期間持続する。
- ノビエの後発を長期間抑制する。
- クサネム、イボクサ、タウコギ等の難防除雑草にも優れた効果を示す。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】

〈共通〉

- 共通注意事項の5. 水稻除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- ノビエの3葉期まで (但し、直播水稻は2.5葉期まで) に散布する。
- 多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布する。

〈移植水稻〉

雑草名	散布適期	
	粒剤	フロアブル
ホタルイ ヘラオモダカ ウリカワ	3葉期まで	
オモダカ クログワイ	発生前～発生始期まで	
ミズガヤツリ	3葉期まで	4葉期まで
ヒルムシロ	発生期まで	
セリ	再生前～再生始期まで	

〈直播水稻〉

雑草名	散布適期	
	粒剤	フロアブル
ホタルイ	2葉期まで	2葉期まで
ヘラオモダカ		—
ウリカワ	1葉期まで	2葉期まで
ミズガヤツリ	2葉期まで	3葉期まで
ヒルムシロ	発生期まで	
セリ	再生前～再生始期まで	

【薬効・薬害等の注意】

〈共通〉

- 共通注意事項の5. 水稻除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- 適用作物 (水稻) 及び適用外作物 (いぐさ、れんこん、せり、くわい等) への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】

〈共通〉

- 藻類に影響を及ぼすので、使用时並びに使用後も注意する。

〈粒剤〉

- 無人ヘリコプター散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人ヘリコプター散布・滴下に関する注意事項を参照。

【適用と使用方法】.....

①ジェイフレンド1キロ粒剤

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稲	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ オモダカ クログワイ ヒルムシロ セリ	移植時	1 kg	田植同時散布機で施用	1回※
		移植直後～ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで			
直播水稲	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ノビエ2.5葉期 但し、 収穫60日前まで		湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布	

※オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※テフリルトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ピラクロニルを含む農薬の総使用回数：2回以内

②ジェイフレンドフロアブル

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稲	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ オモダカ クログワイ ヒルムシロ セリ	移植後5日～ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで	500 ml	原液湛水散布又は水口施用	1回※
直播水稲	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ノビエ2.5葉期 但し、 収穫90日前まで		原液湛水散布	

※オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※テフリルトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ピラクロニルを含む農薬の総使用回数：2回以内