

<b>テフリルトリオン・ペノキスラム粒剤</b> <b>ワイドショット1キロ粒剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> 北興  <b>原体メーカー：</b> 全農・バイエル・北興、ダウ
<b>成分：</b> テフリルトリオン〔トリケトン系〕……………3.0% ペノキスラム〔スルホンアミド系〕……………0.50%	<b>性状：</b> 淡褐色細粒 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【品目特性】……………

- 湛水散布が可能な、移植後15日～ノビエ4葉期まで使用できる中・後期除草剤。
- 直播水稻にも使用可能。
- スルホニルウレア抵抗性雑草にも高い効果を示す。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- 共通注意事項の5. 水稻除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- ノビエの4葉期までに散布する。
- 前処理剤との体系で使用し、雑草の発生状況をよく確認し、時期を失しないように適期に散布する。

雑草名	散布適期
ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ	4葉期まで (直播水稻のウリカワは3葉期まで)
オモダカ	草丈30cm以下
クログワイ シズイ	草丈20cm以下
ヒルムシロ	発生期まで
セリ	再生期まで

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- オモダカ、クログワイ、シズイの防除は、必要に応じて有効な前処理剤と組み合わせて使用する。
- 使用後に低温が続くと予想される場合には使用をさける。
- 直播水稻で使用する場合、稲の根が露出する条件下では使用をさける。
- 共通注意事項の5. 水稻除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- 適用作物（水稻）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（いぐさ、れんこん、せり、くわい）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

### 【安全対策上の注意】……………

- 無人ヘリコプター散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。



【適用と使用方法】 .....

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ オモダカ クログワイ シズイ ヒルムシロ セリ	移植後15日～ ノビエ4葉期 但し、 収穫45日前まで	1 kg	湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布	1回 ※
直播水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲4葉期～ ノビエ4葉期 但し、 収穫45日前まで			

※テフリトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ベノキスラムを含む農薬の総使用回数：2回以内