ジノテフラン・カスガマイシン・トリシクラゾール・バリダマイシン粉剤

ダブルカットバリダスタークル粉剤3DL

取扱メーカー:

北興

原体メーカー:

三井アグロ, 北興, ダウ, 住友化学

成分: ジノテフラン [ネオニコチノイド系] …………0.35% カスガマイシン一塩酸塩 [抗生物質] ………0.34% (カスガマイシンとして………0.30%)

性状:類白色粉末45μm以下, 浮遊性指数20以下

毒性:普通物 消防法:——

【適用と使用法】…………

作物名	適用病害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 もみ枯細菌病 ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ	$3 \sim 4 \text{kg}$	穂揃期まで	散布	本剤 2回以内 ジノテフラン 4回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計 1回以内,本田での散布,空中散布, 無人へり散布は合計3回以内) カスガマイシン 4回以内 (種子浸漬は1回以内,育苗箱への処 理は1回以内,本田では2回以内) トリシクラゾール 4回以内
	ニカメイチュウ	4kg			(育苗箱への処理は1回以内,本田では3回以内) パリダマイシン 6回以内 (育苗籍灌注は1回以内,本田では5 回以内)