

イプロジオン水和剤 ロブラール500アケア	取扱メーカー： バイエル 原体メーカー： FMC
成分： イプロジオン〔ジカルボキシイミド系 PRTR・1種〕…40.0%	性状： 白色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】

- フロアブル剤なので薬液の調製が簡単で収穫物の汚れが少ない。
- フロアブル化して、作物の表面を均一にカバーすることにより、防除効果が向上する。
- その他、ロブラール水和剤の項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】

〈野菜類〉

- 体系防除への組み入れ……灰色かび病・菌核病に有効な反面べと病・疫病などに効果が認められないので病害により、他剤との組み合わせ防除が必要。
- 予防散布……発病前から予防的に散布する。

〈おうとう灰星病〉

- 花腐れ防止のための開花時と果実の発病が起る収穫20日前頃から収穫期にかけて重点的に散布する。

【薬効・薬害等の注意】

- 使用の際は、容器をよく振る。
- ボルドー液、石灰硫黄合剤との混用はさける。
- 適用作物（りんご、おうとう）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 眼に対して弱い刺激性があるので、眼に入らないように注意する。眼に入った場合は直ちに水洗する。

【適用と使用法】

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	イプロジオンを含む 農薬の総使用回数
きゅうり	菌核病, つる枯病 灰色かび病	1000～1500倍	前日まで	4回以内	散布	5回以内 (種子粉衣は1回以内, は種後は4回以内)
なす いちご				3回以内		4回以内 (種子粉衣は1回以内, は種後は3回以内)
トマト			14日前まで	5回以内		3回以内
おうとう	灰星病	1500倍		3回以内		5回以内
りんご	斑点落葉病	1000～1500倍	前日まで	1回		3回以内
もも	灰星病	1000倍		3回以内		1回
ハスカップ	灰色かび病	1000倍	3日前まで	3回以内		3回以内
ふさすぐり	果実腐敗症					
いちじく	黒かび病					