

<b>キャプタン・ベンチオピラド粒剤</b> <b>フルーツガード WDG</b>	<b>取扱メーカー：</b> 三井アグロ  <b>原体メーカー：</b> アリスタ LS, 三井アグロ
<b>成分：</b> キャプタン〔有機塩素系〕……………70.0% ベンチオピラド〔コハク酸脱水素酵素阻害剤〕……………7.5%	<b>性状：</b> 淡褐色水和性細粒  <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> —

### 【品目特性】……………

- りんご・なしの幅広い病害に効果が期待できる。
- 優れた予防効果。
- りんごの収穫前日まで使用できる。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- 発病前から発病初期の早めの散布により安定した効果がえられる。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、作用性の異なる薬剤との輪番で使用する。
- 作物全体に薬液が十分かかるようにいねいに散布する。
- 耕種の防除との併用で効果が安定する。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- ボルドー液、石灰硫黄合剤等のアルカリ性薬剤及びマシン油乳剤との混用はさける。

- 蚕に影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。

### 【安全対策上の注意】……………

- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 散布の際は、保護クリームを使用する。作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- 夏期高温時の使用をさける。
- 魚類に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意する。



### 【適用と使用法】……………

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	キャプタンを含む 農薬の総使用回数	ベンチオピラドを含む 農薬の総使用回数
な し	黒星病 輪紋病 炭疽病 うどんこ病	1000 倍	200～ 700 ℓ	3 日前 まで	3 回以内	散布	9 回以内	3 回以内
り ん ご	斑点落葉病 黒点病 褐斑病 炭疽病 輪紋病 うどんこ病 黒星病 モニリア病 すす点病 すす斑病			前日まで			6 回以内	