

スピネトラム水和剤 ディアナ SC	取扱メーカー： 協友アグリ，サンケイ*，ホクサン， 住友化学 原体メーカー： 住友化学
成分： スピネトラム〔スピノシン系〕……………11.7%	性状： 類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- チョウ目害虫はもちろん，アザミウマ目害虫・ハエ目害虫・コナジラミ類に対しても防除効果を発揮するので，幅広い害虫の防除が可能である。
- チョウ目害虫に対して，速やかな食害抑制効果を発揮するので，被害の拡大（進展）を抑制する。
- 茶のハマキムシ類の各発育ステージ（卵・幼虫・成虫）に高い効果を示すので，散布適期が広く使いやすい。
- 収穫（茶は摘採）前日まで使用が可能である。（但し，稲は収穫 7 日前まで）
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 抵抗性回避のため，スピノシン系薬剤は 1 作期 1 回の散布にとどめ，他系統の薬剤とのローテーション防除を心掛ける。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 散布量は対象作物の生育段階，栽培形態及び散布方法に合わせて調節する。
- 散布液調製後はそのまま放置せず，できるだけ速やかに散布する。
- 共通注意事項 8，適用作物群に関する注意事項を参照。

【安全対策上の注意】……………

- つまみ菜，間引き菜には使用しない。
- 共通注意事項 6，街路・公園・堤とう等で使用する場合は注意事項を参照。
- 共通注意事項 7，ミツバチに対する注意事項を参照。



【適用と使用法】

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	スピネトラムを含む 農薬の総使用回数
稲	イネツトムシ コブノメイガ フタオビコヤガ ニカメイチュウ	4000～ 6000倍	60～ 150 ℓ	7 日前 まで			3回以内 (直播では種 時又は移植時ま での処理は1回 以内、本田での 散布は2回以内)
ト マ ト ミニトマト な す	コナジラミ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類 ハスモンヨトウ オオタバコガ	2500倍 2500～ 5000倍					
ピーマン	コナジラミ類 アザミウマ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ	2500倍			2回 以内	散布	2回以内
だいこん	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ ウワバ類 カブラハバチ ハモグリバエ類	2500～ 5000倍	100～ 300 ℓ	前日まで			
はくさい ブロッコリー	アザミウマ類 コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ウワバ類 オオタバコガ ハモグリバエ類						3回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の散布 は2回以内)
キャベツ	アザミウマ類	50～ 200倍	セル成型育苗 トレイ1箱又はペー パーポット 1冊 (30× 60cm・使用土壌約3 ～4 ℓ) 当 り 0.5 ℓ	育苗期 後半	1回	灌注	
かぶ	アオムシ コナガ ハスモンヨトウ ハクサイダニ	2500～ 5000倍	100～ 300 ℓ	前日まで	2回 以内	散布	2回以内
なばな類	コナガ アザミウマ類 アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ						3回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の散布 は2回以内)
カリフラワー							

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	スピネトラムを含む 農薬の総使用回数					
非結球あぶら な科葉菜類 (こまつな, チンゲンサイ, なばな類を 除く)	コナガ ハスモンヨトウ	2500～ 5000倍	100～ 300 ℓ	前日まで	2回 以内	散布	2回以内					
こまつな	コナガ ハスモンヨトウ アザミウマ類 アオムシ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ											
チンゲンサイ	コナガ ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 アオムシ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ											
メロ ん きゅうり	コナジラミ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類											
すいか	コナジラミ類 アザミウマ類 オオタバコガ											
	かぼちゃ	ハスモンヨトウ										
たまねぎ	アザミウマ類 ネギハモグリバエ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ	2500～ 5000倍										
ねぎ	アザミウマ類 シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ ネギコガ											
らっきょう	ネダニ類	2500倍						—	植付前	1回	30 分間 種球 浸漬	3回以内 (種球浸漬は1 回以内, 散布は 2回以内)
にんにく にら	アザミウマ類	2500～ 5000倍						100～ 300 ℓ	前日まで	2回 以内	散布	2回以内
しゅんぎく	オオタバコガ ハスモンヨトウ											
レタス 非結球レタス	ハモグリバエ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ アザミウマ類											
セルリー にんじん	ハスモンヨトウ											
いちご	アザミウマ類 ハスモンヨトウ											
	コナジラミ類 クロバネキノコバエ類	2500倍										

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	スピネトラムを含む 農薬の総使用回数					
ほうれんそう	ハスモンヨトウ シロオビノメイガ ハモグリバエ類	2500～ 5000倍	100～ 300 ℓ	前日まで	2回 以内	散布	2回以内					
つるむらさき		2500倍										
ばれいしょ ざ い も	ハスモンヨトウ	2500～ 5000倍										
かん し ょ	ナカジロシタバ											
豆類(未成熟) 豆 類 (種実, 但し, あずき, らっかせいを 除く)	ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 アザミウマ類											
あ ず き	ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 アズキノメイガ アザミウマ類	2500～ 5000倍	100～ 500 ℓ									
アスパラガス	コナジラミ類							2500倍				
	アザミウマ類 ハスモンヨトウ オオタバコガ ジュウシホシクビナガハムシ							2500～ 5000倍				
食 用 ギ ャク	アザミウマ類 オオタバコガ ハモグリバエ類							100～ 300 ℓ				
しょうほおずき	アザミウマ類											
て ん さい	ヨトウムシ シロオビノメイガ	5000～ 7500倍										
茶	チャノキイロアザミウマ チャノコカクモンハマキ チャノホソガ チャハマキ ヨモギエダシヤク チャトゲコナジラミ ニトベミノガ	2500～ 5000倍	200～ 400 ℓ	摘採前日 まで	1 回		1 回					
花 き 類・ 観 葉 植 物 (りんどうを 除く)	アザミウマ類 オオタバコガ ハモグリバエ類 イラクサギンウワバ	2500倍	100～ 300 ℓ	発生初期	2回 以内							
	コナジラミ類 クロバネキノコバエ類											
り ん だ う	アザミウマ類 オオタバコガ ハモグリバエ類 イラクサギンウワバ リンドウホソハマキ	2500～ 5000倍										
	クロバネキノコバエ類 コナジラミ類	2500倍										
	アザミウマ類 オオタバコガ	2500～ 5000倍										
わ た			200～ 700 ℓ									
樹 木 類	ハマキムシ類											