

ジノテフラン粉剤 スタークル粉剤 DL	取扱メーカー： サンケイ＊、北興 原体メーカー： 三井アグロ
成分： ジノテフラン〔ネオニコチノイド系〕……………0.50％	性状： 類白色粉末45 μm 以下、 浮遊性指数20以下 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

●水稲のカメムシ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、イナゴ類、イネドロオイムシ、ニカメイチュウ、フタオビコヤガに高い効果を示す。

●カメムシの種類を選ばず高い活性を示すほか、殺虫効果と吸汁阻害効果で効率的な斑点米抑制が期待できる。

●だいず・えだまめのカメムシ類・フタスジハムシの防除にも使える粉剤である。

●稲・だいず・えだまめに収穫7日前まで使える薬剤である。

●人畜・魚類・鳥類に毒性が低い薬剤である。

●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【安全対策上の注意】……………

●蚕に影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。

●眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意する。入った場合には直ちに水洗する。

●共通注意事項7、ミツバチに対する注意事項を参照。



【適用と使用法】……………

作物名	適用場所	適用害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	ジノテフランを含む 農業の総使用回数
稲	—	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 イナゴ類 イネドロオイムシ ニカメイチュウ フタオビコヤガ	3 kg	7 日前 まで	3 回以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理 及び側条施用は合 計 1 回以内、本田 での散布、空中散 布、無人ヘリ散布 は合計 3 回以内)
だいず		カメムシ類 フタスジハムシ ダイズサヤタマバエ			2 回以内		3 回以内 (は種時の土壌混和は 1 回以内、散布は 2 回以内)
えだまめ							2 回以内
水田作物、 畑作物 (休耕地)	ヨシ、オギ、ススキ、 セイタカアワダチソ ウ等の多年生雑草が 優占している休耕地	カメムシ類		—	3 回以内		3 回以内