

<b>トルフェンピラド・メタフルミゾン水和剤</b> <b>アクセルキングフロアブル</b>	<b>取扱メーカー：</b> O A T, 日農 <b>原体メーカー：</b> 日農, 日農
<b>成分：</b> トルフェンピラド〔PRTR・1種〕……………12.0% メタフルミゾン〔セミカルバゾン系〕……………19.0% <b>その他 PRTR 該当成分：</b> パリゴルスカイト〔PRTR・2種〕……………1.2%	<b>性状：</b> 類白色水和性粘稠懸濁液体 <b>毒性：</b> 劇物 <b>消防法：</b> —

### 【品目特性】……………

- チョウ目害虫、コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ、ネギアザミウマ、アブラムシ類など幅広い害虫に優れた効果を発揮する。
- 感受性の低下した害虫にも新規作用性で優れた効果を示す。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- 植物体への浸透移行による効果は弱いので、かけ残しのないように葉の表裏に十分散布する。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 周辺作物（なす、トマト、きゅうり、かぶの幼苗期及びこまつな、チンゲンサイなどの軟弱野菜）にかかると薬害を生じるおそれがあるので、かからないよう十分注意する。
- ばらには薬害を生じるおそれがあるので使用をさける。
- 共通注意事項8. 適用作物群に関する注意事項を参照。
- 適用作物（レタス、はくさい、なす、ばら）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

### 【安全対策上の注意】……………

- 共通注意事項7. ミツバチに対する注意事項を参照。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 天敵昆虫に対して影響があるので注意する。
- 眼に対して弱い刺激性がある。
- 魚類、甲殻類に影響を及ぼすおそれがあるので、使用時は注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。



【適用と使用法】 .....

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	トルフェンピラ ドを含む農薬 の総使用回数	メタフルミゾ ンを含む農薬 の総使用回数
かんきつ	ゴマダラカミキリ チャノキイロアザミウマ	2000 倍	200～ 700 ℓ	7 日前 まで				
キャベツ	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ウワバ類 ハイマダラノメイガ アブラムシ類 ネギアザミウマ	1000 倍						
はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ アブラムシ類 ナモグリバエ ネギアザミウマ			14 日前 まで	2 回以内		2 回以内	3 回以内
レタス	オオタバコガ アブラムシ類 ナモグリバエ ハスモンヨトウ	1000～ 1500 倍	100～ 300 ℓ			散布		
	ヨトウムシ ウワバ類	1500 倍						
ねぎ	シロイチモジヨトウ ネギコガ ネギアザミウマ			7 日前 まで				2 回以内
花き類・ 観葉植物 (きくを除く)	アブラムシ類 オオタバコガ アザミウマ類	1000 倍						
きく	アブラムシ類 オオタバコガ アザミウマ類 ハスモンヨトウ ハモグリバエ類			発生初期	4 回以内		4 回以内	6 回以内