

クロチアニジン粉剤 ダントツ粉剤 DL	取扱メーカー： 協友アグリ，サンケイ*，ホクサン， 住友化学 原体メーカー： 住友化学
成分： クロチアニジン〔ネオニコチノイド系〕……………0.15%	性状： 類白色粉末45 μ m以下， 浮遊性指数20以下 毒性： 普通物 消法： —

【品目特性】……………

- 幅広い殺虫スペクトラムを有し，カメムシ類やイナゴに対しても優れた防除効果を示す。
- カメムシ類に対しては，殺虫効果の他に吸汁抑制効果を示し，斑点米の発生を抑制する。
- 有機リン・カーバメート・合成ピレスロイド系薬剤に対する感受性が低下した害虫にも高い効果を発揮する。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- カメムシ類を対象に使用する場合は，カメムシの発生状況に合わせて散布する。

【安全対策上の注意】……………

- 眼に入らないように注意。眼に入った場合は直ちに水洗する（弱い刺激性）。
- 共通注意事項7．ミツバチに対する注意事項を参照。
- マルハナバチに影響を及ぼすおそれがあるので注意する。



【適用と使用法】……………

作物名	適用害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	クロチアニジンを含む 農業の総使用回数
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	3 ～ 4 kg	7 日前まで	3 回以内	散布	4 回以内 (直播では種時又は 移植時までの処理は1 回以内，本田での散布， 空中散布，無人ヘリ散 布は合計3回以内)
	イナゴ類	4 kg				
	イネドロオイムシ フタオビコヤガ	3 kg				
だ い ず	アブラムシ類 カメムシ類 フタスジヒメハムシ	4 kg				4 回以内 (は種時の土壌混和は1 回以内，散布は3回以内)

作物名	適用場所	適用害虫名	10 a 当り 使用量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クロチアニジンを含 む農業の総使用回数
水田作物， 畑作物 (休耕田)	ヨシ，オギ，ススキ， セイタカアワダチ ソウ等の多年生雑 草が優占している 休耕田	カメムシ類	3 ～ 4 kg	—	4 回以内	散布	4 回以内