

ジメテナミドP・リニュロン乳剤  
**エコトップ<sup>®</sup>P乳剤**

取扱メ一力一：  
日産、丸和

原体メーカー：  
BASF, TKI

成分：ジメテナミドP〔酸アミド系〕	8.5%
リニユロン〔尿素系 PRTR・1種〕	12.0%
その他 PRTR 該当成分：	
キシレン〔PRTR・1種〕	1.1%
ナフタレン〔PRTR・1種〕	6.1%
メチルナフタレン〔PRTR・1種〕	12.0%

**性状：**黄赤色澄明可乳化油状液体

毒性：普通物

消防法：第4類・第2石油類（非水溶性）・危険等級Ⅲ

【品目特性】 .....

- エコトップP細粒剤Fの項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

## 【使用上のポイント】 .....

- 所要量を水で希釈し、よく攪拌してから散布する。
- 発芽後の雑草に対しては効果が劣るので、雑草発生前に時期を失ないように散布する。

## 【薬効・薬害等の注意】 .....

- 砕土、整地は丁寧に、種子が露出しないように覆土はできるだけ丁寧に、覆土深を2〜3 cm以上とする。
- 散布に使った器具などはよく水洗いして、他の用途に使用する場合は影響のないように注意する。

- マルチ栽培、トンネル栽培等での使用は、葉害を生じるおそれがあるのでさける。
- 隣接作物に飛散すると葉害を生じるので、飛散しないよう注意して散布する。特に風の強い時の使用はさける。
- 適用作物（だいた、飼料用とうもろこし）の葉害などの注意は「葉害注意事項解説」を参照。

## 【安全対策上の注意】 .....

- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。



【適用と使用法】 .....

作物名	適用 雑草名	使用 時期	適用 土壌	10 a 当り使用量		本剤の 使用回数	使用 方法	適用 地帯	ジメテナミド及び ジメテナミド P を含む 農薬の総使用回数	リニウロンを含む 農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量					
だ い ず	一年生 雑草	は種後 出芽前 (雑草発生前)	全土壌 (砂土を 除く)	400 ～ 600 ml	100 ℓ	1 回	全面 土壌 散布	全域	1 回	2 回以内 (全面土壌 散布は 1 回以内、 雑草茎葉兼 土壌散布は 1 回以内)
飼 料 用 とうもろこし										1 回