

ピラゾレート粒剤 サンバード1キロ粒剤30	取扱メーカー： 三井アグロ 原体メーカー： 三井アグロ
成分： ピラゾレート〔ピラゾール系 PRTR・1種〕……………30.0%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- 直播水稲専用でありは種同時散布が可能な初期除草剤。
- イネ科属間選択殺草性が大きく、ノビエには強く作用する一方で、水稲に対する安全性が高い。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 共通注意事項の5、水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- 本剤は雑草の発生前から発生初期に有効なので、ノビエの1葉期までに時期を失しないように散布する。
- 多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布するように注意する。
- 後処理剤との体系で使用し、雑草の発生状況をよく確認し、時期を失しないように散布する。

雑草名	散布適期
ホタルイ ウリカワ ヘラオモダカ	発生始期まで

【薬効・薬害等の注意】……………

- は種時に通常の湛水状態より水を落として散布する場合は、散布後速やかに通常の湛水状態（水深3～5cm）にする。
- 適用作物（直播水稲）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖地等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- カブレやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 無人ヘリコプター散布の際は、共通注意事項の2、空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。



【適用と使用法】……………

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	本剤の 使用回数	使用方法	ピラゾレートを含む 農薬の総使用回数
直播水稲	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ヘラオモダカ	は種時	1kg	1回	は種同時散布機で施用	2回以内
		湛水直播のは種直後 ～ノビエ1葉期 但し、 収穫90日前まで		2回以内	湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布	