

トルフェンピラド水和剤 ハチハチフロアブル	取扱メーカー： OAT, 日農 原体メーカー： 日農
成分： トルフェンピラド〔PRTR・1種〕……………15.0%	性状： 類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 劇物 消防法： —

【品目特性】……………

●既存の殺虫剤と異なるタイプの殺虫剤なので、既存の殺虫剤に抵抗性を発達させた害虫に対しても卓効を示す。

●なし及びかんぎつのアブラムシに対して、種類に関係なく全てのアブラムシに優れた効果を示す。

●近年発生増加傾向にある、なしのニセナシサビダニ、かんぎつのミカンサビダニ、チャノホコリダニ、もものモモサビダニに対して卓効を示す。

●かんぎつのチャノキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ及びネギアザミウマに対して優れた効果を示す。

●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

●使用前に必ず容器をよく振る。

●植物体への浸透移行性がないので、かけ残しのないように葉の表裏に十分散布する。

【薬効・薬害等の注意】……………

●レタス・非結球レタス、はくさい及びセルリーの幼苗期には薬害を生じるおそれがあるので使用をさける。

●ばらには薬害を生じるおそれがあるので使用をさける。

●周辺作物（きゅうり、だいこん、かぶ、にがりの幼苗期及びこまつな、チンゲンサイなどの軟弱野菜）にかかると薬害を生じるおそれがあるので、かからないよう十分注意して散布する。

【安全対策上の注意】……………

●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。

●共通注意事項7. ミツバチに対する注意事項を参照。

●マルハナバチに対して影響があるので注意。

●天敵昆虫に影響があるので注意。

●魚類、甲殻類に影響を及ぼすおそれがあるので、使用時は注意。



【適用と使用方法】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	トルフェンピラドを含 む農薬の総使用回数					
な し	アブラムシ類 ニセナシサビダニ アザミウマ類 クワコナカイガラムシ	2000 倍	200 ～ 700 ℓ	30 日前まで	1 回	散布	1 回					
な し (苗木)	アブラムシ類 ニセナシサビダニ アザミウマ類		100 ～ 700 ℓ	育苗期								
かんきつ	ミカンサビダニ	2000 ～ 3000 倍	200 ～ 700 ℓ	前日まで	2 回以内							
	アブラムシ類 チャノホコリダニ カネタタキ	2000 倍										
	アザミウマ類	1000 ～ 2000 倍										
	ゴマダラカミキリ コナカイガラムシ類 コナジラミ類 ミカンキジラミ ヨモギエダシヤク ヨコバイ類 ミカンバエ成虫	1000 倍										
す も も	アブラムシ類	2000 倍		14 日前まで								
も も ネクタリン	シンクイムシ類	1000 ～ 2000 倍		前日まで				2 回以内	2 回以内			
	アブラムシ類 モモハモグリガ モモサビダニ	2000 倍										
	アザミウマ類	1000 倍										
さやえんどう 実えんどう	ナモグリバエ	1000 ～ 2000 倍										
	うどんこ病											
キャベツ	コナガ アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ アザミウマ類	1000 倍	100 ～ 300 ℓ	14 日前まで								
はくさい	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ ダイコンサルハムシ ナメクジ類											
	アブラムシ類	1000 ～ 2000 倍										
レ タ ス	アブラムシ類 ナモグリバエ	1000 ～ 2000 倍										
	ヒメフタテンヨコバイ ナメクジ類	1000 倍										
非結球レタス	アブラムシ類 ナモグリバエ	2000 倍					1 回			1 回		

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	トルフェンピラドを含む 農薬の総使用回数
セルリー	アブラムシ類 ナモグリバエ	2000 倍	100 ～ 300 ℓ	30 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
い ち ご	アブラムシ類 アザミウマ類 カキノヒメヨコバイ チャノホコリダニ クロバネキノコバエ類 うどんこ病	1000 倍		1 番花の 開花まで	1 回		1 回
	す い か	アブラムシ類		1000 ～ 2000 倍	前日まで		2 回以内
アザミウマ類 うどんこ病		1000 倍	100 ～ 800 ℓ				
アスパラガス	ネギアザミウマ アブラムシ類 コナジラミ類 ジュウシホシクビナガハムシ ツマグロアオカスミカメ						
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ	1000 ～ 1500 倍	200 ～ 400 ℓ	摘採 14 日前まで	1 回		1 回
	マダラカサハラハムシ チャトゲコナジラミ	1000 倍					
	花き類・ 観葉植物	アザミウマ類		100 ～ 300 ℓ	発生初期		4 回以内
チューリップ	アブラムシ類	1000 ～ 2000 倍	300 ℓ	3 回以内			
	チューリップサビダニ	500 倍	—	掘取後～ 植付前	1 回	15 分間 球根浸 漬	