

<b>デスメディファム・フェンメディファム・S-メトラクロール乳剤 ベタダイヤ S 乳剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> ホクサン  <b>原体メーカー：</b> バイエル、バイエル、シンジェンタ
<b>成分：</b> デスメディファム〔カーバメート系 PRTR・2種〕…2.3% フェンメディファム〔カーバメート系 PRTR・1種〕…10.0% S-メトラクロール〔酸アミド系 PRTR・1種〕…7.5%	<b>性状：</b> 淡黄色澄明可乳化油状液体 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> 第4類・第2石油類（非水溶性）・危険等級 III

### 【品目特性】 .....

●「ベタダイヤ A 乳剤」の有効成分メトラクロールが、活性本体の光学異性体に変更された、てんさい専用生育期処除草剤である。

●デュアルゴールド、ベタナール乳剤の項参照。

●混用の手間が省け省力的（展着剤不要）。

●3種類の有効成分の相乗作用により、イネ科、ヒユ類、タデ類、ツユクサ等、幅広い雑草に効果を示す。

●低水量で使用できるので、作業効率が上がる。

●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】 .....

●雑草が大きくなると、効果が劣るので、適期散布に努める。

●水量が多くなるほど、また薬液調製後の時間が経過するほど結晶を生じ、ノズルをつまらせるため薬液調製後は速やかに散布する。

### 【薬効・薬害等の注意】 .....

●適用作物（てんさい）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

●砂土では使用しない。

### 【安全対策上の注意】 .....

●カブレやすい体質の人は取扱いに十分注意する。



### 【適用と使用法】 .....

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り使用量		使用方法	本剤の使用回数
			薬量	希釈水量		
てんさい (移植栽培)	一年生雑草	移植活着後の 雑草発生前期 但し、収穫90日前まで	500 ml	50 ～ 100 ℓ	雑草茎葉散布 又は 全面散布	1 回 ※
てんさい (直播栽培)		てんさい7葉期以降の 中耕後（雑草発生前期） 但し、収穫90日前まで				

※デスメディファムを含む農薬の総使用回数 : 2 回以内

※フェンメディファムを含む農薬の総使用回数 : 3 回以内

※メトラクロール及び S-メトラクロールを含む農薬の総使用回数 : 2 回以内