

ハイバー X

成分：プロマシル〔ウラシル系 PRTR・1種〕……80.0%

毒性：普通物

【適用と使用法】

| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 10 a 当り使用量 | | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | プロマシルを含む 農薬の総使用回数 |
|---------|--|----------------|---|---------------|--------------------|-------------|--|----------------------|
| | | | | 薬量 | 希釈水量 | | | |
| 温州みかん | — | 一年生雑草 多年生雑草 | 雑草発芽前 又は 雑草生育期 (梅雨あけ期) 但し、収穫 60 日前まで | 200～ 300 g | 雑草発生前 70～100 ℓ | 1 回 | 雑草茎葉 散布又は 全面土壌 散布 | 1 回 |
| パイナップル※ | | | 雑草発芽前 又は 雑草生育期 (梅雨あけ期) 但し、収穫 90 日前まで | 150～ 500 g | 雑草生育期 150～200 ℓ | 2 回 以内 | | |
| 樹 木 等 | 公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 鉄道等 | 一年生雑草 | 雑草発生前 ～生育期 | 300～ 600 g | 100～200 ℓ | 1 回 | 植栽地を除く樹木等の 周辺地に雑 草茎葉散布 又は全面土 壌散布 | 2 回以内 |
| | | 多年生雑草 | 雑草生育 初期～ 生育中期 | 1000 g | 200～300 ℓ | | | |

〔取扱メーカー〕 丸和

※：同一薬剤名（会社名を除き）であっても登録内容が異なる箇所。使用時には必ずラベルで登録内容を確認すること。