

バシレックス水和剤

成分：パチルス・チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素

〔B T 剤〕 ……10.0%（力価 1,000B.m.B. 単位/mg）

毒性：普通物

【適用と使用方法】

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤及びBTを含む 農薬の総使用回数	使用方法
野 菜 類	アオムシ コナガ	1000 ～ 2000倍	100 ～ 300 ℓ	発生初期 但し、収穫 前日まで	—	散布
	タマナギンウワバ	1000倍				
	ヨトウムシ	500倍				
	ハスモンヨトウ					
り ん ご	ヒメシロモンドクガ アメリカシロヒトリ ハマキムシ類	1000倍	200 ～ 700 ℓ			
か き	カキノヘタムシガ イラガ類					
しい た け (菌床栽培)	ムラサキアツバ	500 ～ 1000倍	100 ～ 300 ℓ	幼虫発生期		被害菌床全体 へ薬液が滴る まで散布
茶	チャノコカクモンハマキ		500倍	200 ～ 400 ℓ		発生初期 但し、摘採 7日前まで
	チャハマキ ヨモギエダシャク チャノホソガ					
さんしょう (果実)	アゲハ類	1000倍	200 ～ 700 ℓ	発生初期 但し、収穫 前日まで		
さ く ら	モンクロシャチホコ					
プラタナス	アメリカシロヒトリ	1000 ～ 2000倍				
つばき類	チャドクガ	1000倍				
樹 木 類	トビモンオオエダシャク	500 ～ 1000倍				
ス ト ッ ク	コナガ	1000倍	100 ～ 300 ℓ	発生初期		
フェニックス・ ロベレニー	トビモンオオエダシャク	500 ～ 1000倍	200 ～ 700 ℓ			
芝	タマナヤガ	1000倍	300 ml / m ²			
	スジキリヨトウ シバツトガ	500 ～ 1000倍				

〔取扱メーカー〕 エス・ディー・エス