

クロチアニジン・イソチアニル粒剤 ツインターボ箱粒剤08	取扱メーカー： クミカ 原体メーカー： 住友化学，住友化学・バイエル
成分： クロチアニジン〔ネオニコチノイド系〕………0.80% イソチアニル〔チアジアゾールカルボキサミド系〕…2.0%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： ——

【適用と使用方法】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
湛水直播水稻	いもち病 イネミズソウムシ	1kg/10a	は種時	は種同時施 葉機を用い て土中施用 する。	本剤 1回 クロチアニジン 4回以内 (は種時までの処理は1回以 内，本田での散布，空中散 布，無人航空機散布は合計3 回以内) イソチアニル 3回以内 (は種時までの処理は1回以 内，本田では2回以内)
稲 (箱育苗)	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 内穎褐変病 イネミズソウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ イネヒメハモグリバエ	育苗箱 (30×60 ×3cm， 使用土壌 約5ℓ) 1箱当り 50g	は種前	育苗箱の床 土又は覆土 に均一に混 和する	本剤 1回 クロチアニジン 4回以内 (移植時までの処理は1回以 内，本田での散布，空中散 布，無人航空機散布は合計3 回以内) イソチアニル 3回以内 (移植時までの処理は1回以 内，本田では2回以内)
			は種時 (覆土前) ～移植当日	育苗箱の上 から均一に 散布する。	
			は種前	育苗箱の床 土又は覆土 に均一に混 和する	
			は種時 (覆土前)	育苗箱の上 から均一に 散布する。	
稲	いもち病 イネミズソウムシ	1kg/10a	移植時	側条施用	本剤 1回 クロチアニジン 4回以内 (直播ではは種時又は移植時 までの処理は1回以内，本田 での散布，空中散布，無人 航空機散布は合計3回以内) イソチアニル 3回以内 (直播ではは種時又は移植時 までの処理は1回以内，本田 では2回以内)